

JOANNIS WEISZ,
LEUTSCHOVIA-HUNGARI.
MED. DR.

CONTINUATIO PRIMA
TENTAMINIS
PYRETOLOGIÆ
PRACTICÆ,
SISTENS
FEBRES CARDINALES PRIMAS,
INFLAMMATORIAS.



VIENNÆ,
APUD RUDOLPHUM GRÆFFER,

MDCCLXXXIII.

TO A. M. W. H. S.
J. H. S. H. S. H. S.
J. H. S. H. S.
CONTINUATIO PRIMA
TENTAMINIS
P. R. E. T. O. L. O. G. I. E
P. R. A. C. T. I. C. E
S. I. S. T. E. R. E.
E. I. N. E. S. C. A. R. I. S. A. L. I. S. P. R. I. M. I. S.
I. N. T. A. M. I. N. I. S.



V. I. N. I. S.
A. T. U. S. H. U. D. O. L. I. T. I. M. G. R. A. T. I. O.
T. H. E. O. L. O. G. I. C. A. L.

EXCELLENTISSIMO

AC

ILLUSTRISSIMO DOMINO

C A R O L O

è COMITIBUS

PALFY AB ERDÖD,

Perpetuo in Vereskö, Arcis & Dominio-
rum Marhek, Dévén, Detrekö, & Ba-
torkefzy ;

HÆREDITARIO DOMINO

Inclytorum Comitatum, Pofonienfis
quidem

P E R P E T U O,

Zemplinienfis vero

SUPREMO COMITI;

Arcis regiæ Pofonienfis

HÆREDITARIO CAPITANEO;

Sacratiffimæ C. R. A. Majestatis

C A M E R A R I O

& Actuali intimo

STATUS CONSILIARIO;

nec non
per Inclytum Regnum Hungariæ
PRO-CANCELLARIO AULICO
HUNGARICO;

CUJUS
PRÆDECESSORES
ob intemeratam erga Principem fidelita-
tem, Amorem erga Patriam,
per

Sæculorum decursum
Sago, toga inclaruerant, splendebant;
qui **IPSE**

AUGUSTISSIMO

Charus
Nativi soli Concivibus

Amantissimus es,

quod

Tui Inclyti Comitatus Zemplinienfis

me Phyticum dignum judicaveris

declaraveris,

atque ut

Pagellæ hæ Medicarum lucubrationum,

in patria præxi collectarum, morbum Hun-

garorum populo, ob cælum de die, ma-

xime æstate, æstuosum, de nocte semper

rigidum, at hyeme præprimis inter mon-

tes rigidissimum, corpusque ipforum robu-

stum, atque vini præstantissimi consuetum,

vulgatum usum, sub variis ejus faciebus

& medelis designantes,

eo auspiciatus

in lucem prodire valeant

TUI

Insignis & perspicui Nominis honoribus

atque

TUÆ Clientelæ æviterne

hanc opellam

&

Se totum

D. D. D.

AUCTOR.

PRÆFATIO.

Ante biennium & ultra *Tentamen inaugurale*, *tabellare*, limitibus academicis & Tyronis Medici circumscriptum, PYRETOLOGIÆ PRACTICÆ edidi; juxta ideas ad ægrotorum lectos nosocomii practici & S. S. Trinitatis Vindob. conceptas; sub manu ductione fideli *Viri è Medicis nostri sæculi primariis*, *perspicacis*, *diligentis*, *dextri Observatoris*, *felicis*, *celebris Practici*, *Amici*, *immo Patris discipulorum Suorum*, *Magni*, *Inmortalis*, *Professoris STOLLII*.

Non fine omni eruditorum ad-
plausu laborem hunc exiguum a me
susceptum fuisse , grata mente , cum
voluptate percepi. Exemplaria om-
nia distracta jam denuo exquiruntur.

In Patria Praxi Scepusiensi Hun-
gariæ ampla , non infelici hucdum
versatus ; ubi ventus carpathicus ri-
gidissimus regionem , montibus undi-
que cinctam perflat ; ubi vina gene-
rosa Tokaviensia ab ditioribus , &
cremata ab agrestibus promiscue , co-
piose a plurimis hauriuntur ; ubi in-
colarum plurimorum corpus robur
ferme scythicum præsefert ; morbi-
que Inflammatorii vel ideo copiosi
occurrunt ; occasionem optatam ob-
servandi denuo habui. Privata quæ-
dam

dam negotia me hoc anno Viennam
duxere. Horis ab his vacuis erui,
consignavi quædam e pugillaribus,
diariis meis practicis, & *Magno*
STOLLIO tradidi. Placere hæc *Do-*
cto, *optimo Viro*. En *Lector be-*
nevole originem præsentis Libelli.

Ex parte itaque promissis stare
adlaboro, *TIBI* in præfatione *Pyre-*
tologiæ factis, me opusculum dum
& quantum potuero, perfecturum.
Historias morborum, quanquam non
omnes momentosas, enarrandas cen-
sui, quantum licuit, contractas, bre-
ves; ut divisionem Inflammationum
novam, eo certius ex his eruere, &
TIBI qua genuine practicam sistere
valeam.

Vale, meque ama, & si Cenfor
es, mite, humane, censeas ; quia,
si meliora docebis, in me promptissi-
mum, nullatenus obtrectantem, aut
ingratum reperies sectatorem, disci-
pulum TUUM.



CON-

CONSPECTUS CONTENTORUM.

CAPUT PRIMUM pertractat *Inflammationes plenitudinum*, seu *abundantiæ humorum*, sanorum & pravorum, universales & locales, formatas, & formari incipientes, seu *prædispositiones phlogisticas*; dein alios quoque plenitudinum morbos cum prioribus inseparabili nexu junctos, sed hos tantum quasi transeundo. Capitis hujus

§. I. Breviter exempla morborum *plenitudinis cruoris*, seu *plethoræ veræ*, & *plenitudinis cachexiæ pituitosæ*, *leucophlegmaticæ*, *chloroticæ*, *inflammatoriæ* tamen, corollaria insimul, (quartum ex his *Ephemeram peculiarem infantum lactantium*,) commemorat.

§. II. Morbos *Plethoræ* à theoretica Medicorum schola adpellatæ *spurix*; seu *effectus* in nostrum corpus *aërum*,
fixi,

fixi, phlogistici, seu incensibilis, acidi mercurialis; opii, reliquorum narcoticorum; vini, aliorum spirituosorum; insolationis; nimii motus, balneorum fervidorum &c. &c. exponit.

§. III. *Calus seu historias inflammationum lactearum, internarum præprimis, & cum his juncta alia, prolixius describit, atque theoriam harum adjungit.*

CAPUT SECUNDUM, *Inflammationes acrimoniosas* continet, hujusque

§. I. *Theoriam harum,*

§. II. *Inflammationes defluxivas, una & signa speciatim earum tradit, & corollaria.*

§. III. *Inflammationes phthysicas* narrat, argumentaque adducit, phthysim ad inflammationes pertinere. Specialiter quædam de *phthysi quadam humoralis,*

rali, methodo Anglorum curanda, & phthysi organica.

§. IV. *Inflammationes siphyliticas commemorat.*

§. V. *Inflammationes & Phthyses mercuriales ; quædam de methodo antihydrophobica Gallorum.*

§. VI. *Inflammationem cancrofam.*

§. VII. *Inflammationem scorbuticam.*

§. VIII. *Inflammationem urinosam.*

§. IX. *Inflammationem variolosam, morbillosam attingunt.*

§. X. *Inflammationes dysentericas.*

§. XI. *Inflammationes biliosas , putridas , pestilenciales , exanthematicas, cum theoria, & corollariis practicis, recenset.*

CAPUT TERTIUM consignat *Inflammationes stimulorum mechanicorum.*

§. I. *Inflammationes dentientium.*

§. II. *Inflammationes traumaticas, vulnerarias, specialiter quid de febre vulneraria, huc & colicæ herniosæ, venena acria pertinent.*

CAPUT QUARTUM enarrat *Inflammationes latentes.*

CAPUT QUINTUM, *Periodicas, Chronicas, Epidemicas.*

CAPUT SEXTUM de diversitate curæ inflammationum practice differit, & descriptionem generalem inflammationum exhibere tentat.



FEBRIS ARDENS, NON CAUSON. SYNO-

CHUS NON PUTRIS CONTINUA : SY- Synony-
mia.

NOCHUS SIMPLEX : CONTINENS IN-

PUTRIS : *Nobis* INFLAMMATORIA ;

quoad *essentiam* , *causam* suam *proxi-* Causa pro-
xima.

mam , hodie dum nos latere videtur. Ex-
plicationes Virorum magnorum e dia-
metro sæpe sibi adversantes, id lucide
confirmant.

Seposito tantisper omni systemate, fragmen- Fundamen-
ta Tractatûs
ta quædam e casibus meis practicis eru-

ta,

ta congeram; attentus in *causas*, seu
prædispositiones internas phlogoseos, &
diversas inde natas *facies* ejus, æque
in *curam*, seu *nocentia* & *juvantia*.

Insuper *historiæ partium corporis externi*,
mole quadam *pressarum*, vi *tusarum*,
vulneratarum, *laceratarum* &c. &c. sti-
mulo alio acri calido *irritatarum*, tu-
morumque *superficie* corporis, seu *infa-*
ctus, eorumque *exitus*; pro parte mi-
hi *fundamenta* dabunt *ædificio* *Inflam-*
mationi internæ *struendo*.

CAPUT PRIMUM.

De inflammationibus plenitudinum.

§. I.

Prædispositio prima ad inflammationes formatas, aut formari incipientes, universales, id est omnibus aut pluribus vasis proprias; topicas; id est quibusdam solis vasis, visceribus, organis, locales, est plenitudo, seu abundantia, humorum, eorumque vel sanorum; cruoris, lactis, pinguedinis &c.

vel cachecticorum, leucophlegmatix, peripneumonix nothæ, chloroseos, febrium pituitosarum, nervosarum &c. &c.

Exempla plenitudinis humorum sanorum.

Civis vidua, agilis alias, menstruo fluxu ob annos cessante, pinguescere nimium incipit. Lassitudo mentis & corporis, pedes quasi plumbei, sensus quidam anxius circa cor, ut ait; respirii ad motum, aut adscensum loci altioris, difficultas; calores; sudores ferre perpetui, eam adfligunt. Venæsectio larga, nitri & cremoris tartari longior usus; absti-

Obesitatis
effectus.

B

nen-



mentia cœnæ & cerevisiæ, motus frequentior, potus acescentes, eam curavere.

Amaurose-
os incipien-
tis, aut
phrenitidis
plethoricæ
symptomata.

Femina pauper cephalalgia ardenti, obscuratione visus momentanea, at frequenter recrudescente, scintillarum ante oculos volutatione præprimis post pastum, post crematum consuetum, moderate etiam haustum, toto messis tempore, vexabatur. Succulenta plena est, pulsum plenum, durum habet. Venæsectio pedis, cucurbitæ nuchæ adplicatæ, lac ebutyratum cum cremore tartari, ad caput oxycratum frigidum repetitum, miseram brevi restituere.

Melancho-
lia, aut Ma-
nia incipi-
ens pleni-
tudinis.

Robustus, quanquam macilentus, lanio, dum dives jam vitæ sedentariæ indulgere, lautius vivere post mortem uxoris operosæ, inceperat: pervigil fit, & si obdormit, insomniis terrificis excitabatur; inquietus tum vel media sub nocte hinc & inde curstat, pellente, ut ait, invincibili anxietate; pulsus tensus, durus. Duplex venæsectio, acida mineralia, quia vegetabilia & nitrum & purgantia antiphlogistica non suffecerant, atque novum matrimonium virum pacatum reddere.

Sena-

Senator habitus pleni, cephalea aliquot septimanarum vertigine dein spasms musculorum oris, momentanea sui inconscientia, verbo, prodromis apoplexiæ adfectus: repetita ter venæsectione, & purgante aliquot diebus continuato, pulposo, acescente salino, cum nitri largiori dosi mixto, lemonada insuper pro potu communi copiosa, restitutus.

Prodromi
apoplexiæ
sanguineæ.


Femina juvenis, athletici ferme habitus ex venæsectione consueta, neglecta, dolore artuum vago punctorio, aciculoso, sæpe & caput oberrante, tumque cum vertigine una febris per vices laboravit.

Ephemera,
& rheumata
plethorica.

Chirurgum ab aliquot jam annis proprio consilio, vel minimo sub ægritudinis sensu sæpius per annum phlebotomiâ celebrare, solitum; appropinquante venæsectionis tempore, bis vidi ephemera & dolore pedum (multum enim qua venator insignis cursitavit) sensibili afflictum; venæsectione, aut cucurbitis regioni dolenti adplicatis in momento ferme ea disparuisse.

Hæmorrhoidarius Juvenis tinctor tussi subperipnevmonica adficatur, quam una venæsectione, nitrosum emulsum, ac dein mixtura sti-

Subperip-
nevmonia
hæmor-
rhoidalis.



biata oxymellita facile sanarunt. Post medium annum tussis cum pectoris oppressione peior redit, hæmorrhoides tument, arte benignæ naturæ alvus simul fluit. Vapores emollientes, balnea pedum, infusum emolliens & purgans salinum, ut naturæ conamen suffulciens hæmorrhoides aperiunt; fluunt hæ, & mala pectoris evanescunt.

Vertigo,
colica hæ-
morrhoi-
dalis.

Mercator succulentus de vertigine, spinæ dorsī et lumborum dolore, ardore tuberculorum hæmorrhoidalium lamentabatur; averfatur sanguifugas, alvus obstructa est. Venæsectio & manna cum pulpis in sero lactis acido dissoluta cum nitro medelam adtulere.

Corollaria.

* Hæmorrhoidibus cœcis purgantia antiphlogistica, non falsa nimium, multo minus resinosa, egregia reperii; lac ebutyratum, serum lactis tamarindinatum, manatum, & similia. Colica ipsorum, per fæces induratas, acres, orta, (quia omnes ferme alvo obstructa laborant) comprimentes, irritantes venas his tollitur. Egregium olei ricini usum ignoravi. Alia longe res est in hæmorrhoidibus

bus

bus mucosis, corpore leucophlegmatico. Feminam his adfectam Menhardivillensem curavi pilulis balsamicis Stahlî.

Aliquot novi femellas, carne molli & plenâ potui turcico lacteo, aut cerevisiæ, indulgentes; quæ gravidæ factæ multum vomuerant, frequentiora animi deliquia passæ sunt, quibusque, præparata menthæ, chamomillæ, opium, noxia potius fuere; et venæsectio levamen dedit. Uni earum jam primo graviditatis mense cruorem extrahere, ob vomitum enormem, coactus.


Vomitum
gravidarum
sine
plethoricis.

Uxor mollitoris in 4 mensem gravida ferina ferme tussi sicca adfligitur, una cephalalgia gravibus. Venæsectio, potus emollientes, mixtura mucilaginea nitrosa malum minuerunt.

Tussis ferina
gravidæ
plethoricæ.

Sodalis pellio, juvenis robustus, susurrus aurium tanto vexatus, ut vix clamorose loquentem audiret. Vapor emolliendo discutiens, venæsectio larga pedis, & nitrum ferme ad unciam semis de die adsumptum intra paucos dies ægrum juvârunt.

Susurrus
aurium
plethoræ.



Hemiple-
gia men-
strualis.

Agafonis mollaris uxor 30 & aliquot annorum menstrua amittit, quin gravida sit. Post aliquot menses subitanea hemiplegia nocturna prostrata jacet. Duplices venæsecti ones factæ, tum clysmata emollientia, nitrosa, per os sal amarum et manna ingeruntur absque effectu. Pulsu tum semper tardiori, drastico resinoso mercuriali purgante, & clysmate ex tartaro emetico, aliquoties alvo commota, atque vesicantibus more Londinensium amplis & latis extremitatibus & nuchæ successive adplicatis, præsentia mentis redit, absque loquela, & motus quidam obscuri partis adfectæ sensibiles fiunt. Iteratis frictionibus ex tinctura cantharidum, spiritu formicarum diluta, floribus arnicæ, camphoræ largis dosibus adhibitis, usum partis hemiplecticæ successive ex toto, at loquelam nonnisi venæsectione duplici in raninis celebrata, et ictibus electricis omni die auctis, successive balbutiendo ex parte recuperavit.

Corollaria.


* Venæsectio duplex sanguinem menstruum lentum, fors spissum capiti inhærentem eduxisse videtur. Clysmata, purgans, æque revellenda egerunt, post hæc enim aliquis sensus re-

rediit Reliquam fors partem feri aut cruoris stagnantem vesicantia movebant; at stases reliquas, & paralyfi linguæ nonnisi arnica, camphora, ignis cœlestis tollere valuit.

In apoplexiis plethoricis, seu sanguineis, quodvis stimulan, sanguine non demto prius et antiphlogisticis tentatis, venenum esset: at præmissis his inanis horum erit usus ulterior: nervum enim sensibilitate sua, vas distensum tono suo orbatum, quanquam causa premens ablata sit, at non effectus causæ, vix antiphlogisticis, aut tarde nimium, curabis: bene vero alterantibus, stimulantibus effectum causæ tolles, nervo iterum his irritabili facto.

Nonne flores arnicæ stimulant, roborantes, sæpe eventu felici extravasata capitis solverant: eadem hic ratio mihi videtur, vesicantium, camphoræ.

Eadem mihi videre contigit in rustico harhoviensi, qui venæsectionibus, clysmatibus ex apoplexia calida ad sensum sui quidem reductus; at pedum & linguæ motum perdifficilem antiphlogistica diu per me continuata tollere non potuerant.



* Apoplexiæ submerforum , suspenso-
rum huc referendæ sunt.

Nobilis Domina frequentioribus venæsectionibus ab ætate juvenili adsueta terminum venæsectionis protrahit , profusa narium hæmorrhagia laborat.

Anevrysmata , varices ad plenitudines topicas merito referuntur : venæsectiones parcæ at frequentes ideo anevrysmaticos levant , & servant , una cum diæta tenuissima.

Exempla plenitudinis cachecticæ phlogisticæ.

Peripnev-
monia chlo-
rotica.

Virgo nobilis , habitu toto chlorotico , tussi cum sputis , pituitoso - flavis ab aliquot abhinc annis vexabatur ; menstrua parca , inordinata ; collum scrophulosum est : hyeme inchoante omnia symptomata peripnevmonix veræ in ea se manifestant , Venæsectio pectori magnum fert levamen , & sanguinem eduxit pleuriticum. Serius sale ammoniaco martiali cum gummi ammoniaco , et intermixtis rhabarbarinis usa , perfecte restituta fuit.


Specta-

Spectabilis Domina *** habitus laxi, multarum prolium mater, circa 50 ætatis annum; me consuluit, fluore albo aliquot annorum, benigno initio, acriori jam facto, laborans. Rhabarbarina, decocta purificantia, roborantia, solventibus mixta malum inminuunt. Ut citius hoc ex toto liberetur, largioribus dosibus medicamen roborans haurit: nunc fluor albus cessat, menstrua, alioquin parcissima, sanguinolenta tantum, penitus emanent. Abdomen intumescit, respiratio difficilis facta, anxietates, febris oriuntur. Proprio Marte venam aperiri curat, & purgans adsumit, optimo successu. Curata perfecte dein balneis Bartsenfis frigidis, & acidulis iisdem martialibus.

Anxietas,
tumor abdominis,
respirii
gravitas,
febris ex
retrogresso
fluore albo

Puella 18 annorum menstruis penitus caruit, toto corpore pallebat, respiravit anxie, cor palpitavit, pulsus vero plenus fuit. Venæsectio in pede cordis & pectoris mala sustulit. Purgantia omni 7. 8. die ex rheo & sale ammoniaco, & vinum roborans chalybeatum cum corticibus stimulantibus, una decoctum solvens, balnea pedum, vapores

Respiratio
difficilis,
cordis palpitatio ex
plenitudine chlorotica.



&c. menstrua provocarunt, & ægram sanarunt.

In putridis lentis nerveis hyemalibus, autumnalibus sæpe topicas oriri inflammationes, moderatam phlebotomiam desiderantes, constat. —

Idem in peripnevmoniis nothis fieri æque notum, vulgatum est.

Procuratoris Posonienfis memini, declinante hyeme peripnevmonia notha correpti, pulmonibus longa tussi pituitosa, fors & scrophulosa prædispositis. Duplex parca venæsectio mala pectoris quidem levavit, febrem imminuit; at ad tempus solum, 14ta enim circiter morbi die respiratio orthopnoica, vires vitæ dejectæ, pulsus tenuis, verbo, omnia desperata fuere: quibus nec gummi ammoniacum, nec squilla, nec kermes levamen prius conciliare potuit. Indicatione tum vitali facta camphora in emulso, stib. diaphor. in infuso serpentariæ, & contrajervæ, vesicantia 5 successive adplicata febriculam optatam, pituitam moventem, incendebant, secuta fuit expectoratio copiosa puriformium, pituitosorum, tenacium; & æger convaleuit; serius lychene & cortice usus &c.

Corollaria.

*) Plenitudines ergo ad phlogosim prædisponentes erunt. Obesitas, plethora cruoris, robustum, rigidum corpus, seu plenitudo carnis, &c. graviditas, menstruatio, quam alioquin sine locali plethora concipere vix possumus, hæmorrhoides, chlorosis, leucophlegma ia &c. varices, & lac, de quo statim sequetur.

**) Exserunt se hæ dispositiones cephalalgias vagis, periodicis, & vertiginibus, aurium susurru, oculorum scintillatione, somno inquieto, aut comatoso, insomniis terrificis, caloribus auctis post tepida, aut spiritiosa, aut motum corporis, doloribus vagis, punctoriis, latera, artus oberrantibus, gravitate artuum & animi tarditate, difficiliiori spiritu, sensu quodam peculiari, anxio circa cor, in sudores propensione, colorum faciei varia mutatione, cruore è vena misso, spisso, paucò sero inmixto, vel pleuritico, *vel chyloso, lacteo, ut in Monacho plethorico mihi & aliis videre contigit*; quanquam non post passum cruor extractus fuerit. Sæpe & se exserunt cachectico, quasi lardaceo, corporis habitu, & his pessimæ inflammationes nascun-




scuntur, tussi sæpe sicca, stupore frequenti artuum, quin sedendo arteriam premant; pulsu duro, forti, pleno, celeri, aut sæpe tardo, suppresso; excretionibus suppressis, aut sanguineis ortis, alvo dura plerumque, cuti sicca, urina rubra &c. &c.

***) Theoria vulgata originis inflammationum & plethorarum, earumque effectuum ad has plenitudines quadrare videtur; nempe rigidorum robustorum vasa ulteriorem extensionem difficiliter, aut vix, admittunt, aut distrahuntur humoribus nimium auctis, cruor indies chylo admixto cumulatur, spissescit, gravius potentius premendo irritando in vasa agit; hæc hac vi majori impulsa denuo reagunt in cruorem, motus sic ex utraque parte validior nascitur: en genesin febris inflammatoriæ. Laxorum, humoribus accumulatis resistere non valentium, vasa, tonum dein perfecte perdunt, infarctui locum dantes, aut plane rumpuntur, humores æquè elabuntur, actionem visceris, organi suffocant, id quod in venis cerebri præprimis fit; en genesin apoplexiarum, paralyfium, suffocationum &c. aut tenuiora tantum exprimuntur, serum adcumulatur, en genesin hydropis. Hoc serum jam tali ratione ut plenitudo cruoris, phlo-

phlogosin producere valet, & hydrops oritur plethorico-inflammatorius, visus & curatus nobis in Nosocomio practico, venæsectionibus & toto adparatu antiphlogistico. Similiratione post peripnevmonias oritur ex sero transudante.

Idem fit cum plenitudine cachectica; æque vasa infarciuntur, tenduntur, premuntur, irritantur, &c. Benefico profecto naturæ conamine fit, si tum validior humorum motus oriatur, quippe qui stases solvit, movet, superfluum ad colatoria ablegat. Profecto quivis sibi & ægro gratulatur Practicus, dum in peripnevmoniis nothis pulsu languente, respiratione orthopnoica, febriculam insurgere sentiat. Nonne sæpe stimulantibus, incidentibus acrioribus, vesicantibus, hæc intendimus? Sæpe tamen hoc naturæ conamen excedit, tumque per Medicum moderatur phlebotomia, aliisve.

****) Plethora universalis etiam sæpe ephemeras producit, uti topica stases pessimas, aut inflammationes locales, juxta partem denominatas, vulgatas.



Unius Ephemeræ memoriam injicio

Ephemeræ
lactantium,

infantum *Lactantium*, dum matres spirituosius indulgere. Matrem nitrosa, refrigerantia exhibita, & infantem, sugentem lac medicatum matris, curant.

§. II.

Plethora
spuria.

Eandem dispositionem ad febres phlogisticas, aliaque mala plenitudinis, easque vel topicas, vel universales, formatas, vel formari incipientes, nobis exhibet *plethora*, quam schola Medicorum theoretica *spuriam* nuncupat. Producunt hanc aëres fixi, phlogistici, seu incensibiles, e. gr. dum acidum vitrioli, cum marte permiscetur, aut fumus carbonum, aut vapores lacuum putridorum; aëres acidis vaporibus volatilibus mineralium inprægnati, aut mercurialibus, arsenicalibus particulis infecti. Narcotica, dein opiata, fumus nicotianæ, insolutio, motus corporis nimii, balnea fervida, vinum, crematum, cerevisia, aquæ minerales aëriferæ.

Exem-

Exempla quædam.


Cum Barone C ***. aërem incensibilem ex acido vitrioli & limatura ferri paravimus sub camino non bene trahente, tempestate pluviosa, atmosphæra consequenter gravi, ad experimenta electrica. Cephalalgia, vomitiones, respirii quædam difficultas, humorum motus validior nos afflixit; mihi adhuc sequenti die caput doluit. Acida & aër liber nobis levamen dedere.

Effectus in
corpus hu-
manum aë-
ris incensi-
bilis.

*) Aëres hi omnes aut pulmones constringendo, aut humoribus per pulmones mixti eos expandendo, citius movendo agunt: maxime caput petunt & adficiunt; vel quia pulmonibus constrictis pléthora topica vasorum encephali nascitur, vel quia mixti sanguine ob naturam suam superiora petunt, vel quia in vasis cerebri magis humores, & per hos vasa æque extendere valent.

Infans 4 mensium in domum peregrinam mihi adlatus facie rubra tumente, oculis clausis, palpebris subtumidis, cum respiratione naturali citiori, stertorosa, somno comatoso sepultus. Mater timide lacrymando auxilium petit, narrat infantem ante duas horas

Coma nar-
coticum.



horas sanum fuisse, at nil ultra fatetur. Theriacam ingestam reor. Clyisma jusculi falsi adplicare jubeo, & ni juverit, oxymel squilliticum per parva cochlearia ingerere, ad vomitum aliquoties ciendum, una cum sanguisugis ad venas jugulares. Infans post emeses aliquot ad se rediit, & mater est tum fassa, se decoctum caputum papaveris rhœados ad clamores infantis sedandos ingessisse.

Continua
infl. uni-
versalis.
Continua
infl. topica
pleuritica.

Juvenis auriga cum fraterculo labore immodico aliquot dierum arando, sub cœlo æstuoso occupantur, cremam, cerevisiam, mixtim hauriunt.

Major natu continua gravi cum delirio brevi post decubuit; minor natu pleuritide inflammatoria: utrique methodo generosa antiphlogistica restituti.

Pleurope-
ripneumo-
nia gan-
grænosa
potatoris.

Lapicida 50 annorum omnium spirituum potator summus tempestate rigida die solis, sub potationibus pleuritide corripitur. Venæsectione parum melioratur. Die Jovis insequenti post mediam vini haustam pleuritis recrudescit, latus cremato inungitur, interne lapis hæmatites in pulvere cum aceto forti ab vetula ipsi propinatur. Die Sabbathi me
advo-

advocarunt. Caput stupidum, lingua crusta nigra obsita, siccissima; sitis, tussis sibilosa, sputa spumantia, sanguinea, respiratio supremis humeris perfecta, dejectionem virium plenariam, statuæ instar immobilis gravis supine jacet, pulsus duri chordæ instar digitum feriunt, intermittunt. Febris continua, urina profunde rubra, sequenti die intensius flava, aquosa solum. Venæsectiones repetitæ sanguinem ex toto pleuriticum, placentam contractam striatam, habentem, vix forfice scindendam, absque sero educunt. Totus adparatus antiphlogisticus Emulsa, Decocta, Eclegmata, Vapores, Cataplasmata &c. nil proficiunt. Accedit singultus sputa nigra, & die Lunæ vesperi morte *gangrenosa* periit.

Cephalalgia post crapulam, somnus comatosus & vomitus ebriorum huc pertinet.

§. III.

De Inflammationibus plenitudinis lactææ.

Observatio biennalis supra fæminam nobilem a juventute ferme prima ex vitio organico ptoicam, duobus nihilominus viris nuptam, trium prolium matrem, ejusdem febres varias. Peripneumonias veras autumnales,

C

les,



les, vernaes, *peripneumonias lacteas*, *præprimis illam ultimi partus*, bilioso æque inflammatorias. Tabidam ultimam corticem quacunque ratione exhibitum respuentem semel plasticis jugulatam, & falsam graviditatem seu hydropem uteri ex humoribus dissolutis ortam, mortem.


Perill. Domina de S — fanis nata parentibus in tertium ætatis annum sana vixit, si incommoda primæ dentitionis excipias. Hoc tertio ætatis anno incuria servilis costas dextri lateris impingit, incurvat magis, unam frangit. — Tribus septimanis, quibus puella ægre valet, mali causa celata manet, nescio, pro quo habita. Cognito tandem morbo Medicorum & Chirurgorum consilio per medium circiter annum diu noctuque thoraculum gestat ferreum. Hoc thoraculo malefano difformitas gibbosa pectoris, aliaque pelveos creatur.

Tussis una pulmonum compressorum & costæ pleuram aut diaphragma irritantis cum sputis ex albo flavescens oritur. Diæta stricta, vitæ regimen reliquum moderatum, medicina ferme perpetua puellam quoad reliquum illæsam servarunt, morbumque pulmonum mitigabant. Autumno declinante aut hyeme

hyeme subsecutorum annorum oppressione thoracis, doloribus laterum, tussi majori, crebriori, febre continua affligebatur, liberata his sputis copiosioribus flavioribus sanguine stratis. Aetatis anno nescio quo, ad ultra zomum nupta primum marito seniculo diviti — gravida fit, tussi aucta, præterque spem moleste, at sat feliciter parit filium, quem rudæ obstetricis manus formatione osium capitis pro lubitu, dein apprehensione laterum capitis ambabus manibus, & reliqui corporis libere penduli motitatione ad artus, ut insana fœmina ajebat, evolvendos, ad morbos prædisposuerunt. Convulsionibus dein obiit, postque mortem pus e naribus & ore fluxit, hinc probabilius ex abscessu encephali interno.

Febris lactea valida, fors & cum alia puerperarum saburrali conjuncta, ob lactationem primarum dierum prohibitam, & clysmata ex metu inani diarrheæ, vetita, fæces antiquas acres putridas puerperarum eluentia, & lac revellentia intermissa.

Depeditio lactis per 15 septimanas e mammis stillantis pulmonum malum augebant. Deserta ab Medico conclamata judicata opera aut benignæ naturæ aut pharmacopœæ amici convaluit.



Maritus primus moritur — & secundo jungitur amato Viro, gravida fit, parit æque feliciter mala primi partus minora; servatur. Biennio exacto denuo concipit: 14 dies ante partum dolores, hæmorrhagia uteri.

Pharmacopola venæsectione, quiete, melam fert.

Quarta post partum die 23. Martii anni 1780. me in patriam reducem accersunt. Hactenus quæ enarravi ore & fide Dominæ nobilis, mariti secundi & Pharmacopolæ recensui.

Quæ sequuntur vidi.

Matrem inveni emaciatam. Quærebat cephalalgiam nocturnam maxime, oris siccitatem, linguæ & faucium, oppressionem thoracis gravem, crebram dolorosam tussim, spasticos musculorum thoracis & abdominis motus, sputa sanguine striata, pulsus celer. Mammæ multum tument, duræ sunt, dolent, calent. Alvus suppressa est, calor, sitis continui; urina rubra. Ex indicatione febris *lactææ inflammatoriæ & mamalis & pulmonum*, venæsectionem ordino parcam, clysmata emollientia, cataplasma ex spec. emoll. lacti incoctis ad mammas; decoct. emolliens althææ tepidum pro potu.

Mixtu-


Mixturam mucaginoso-nitroso-diacodiatam ; diætam vegetabilem. Aliquoties mixtura assumpta vehementius tussitavit, cephalalgia ideo aucta, ægra lamentatur, meque cogitabundum informat, nitrum se ferre non posse ; (Dr. j. infuit mixturæ unc. vj.) eadem ipsi vel ab jusculo salito parum fortius, contingere. Ordino liquorem terræ foliatæ tartari, utpote salis mitissimi, nitri loco, parca quantitate. Continuatis his lac e mammis copiose stillat, lochia lactiformi humore permixta fluunt, sputa cocta puriformia exscreantur. Omnia in melius vergunt &c. applico cicutam, fl. samb. cham. sapon. Venet. in Catapl. Durities in dies minuitur. Tædium Catapl. fecit, ut petitis ægre obediverim & Empl. de Galb. crocatum camph. & Empl. cicutæ mixtum adplicaverim. Odor Galbani & Camphoræ novas turbas fecit. Solum Empl. cicutæ cum melliloto permixtum fert, hocque mammas ad naturalem habitum reduxit.

Decima septima morbi die gravi ira prægressa jusculoque carnosio meraco assumpto, caesæa mane lactea hausta, cephalalgia, amor oris sordes, ructus peculiare quasi singultuosi & sæpe vigesies, trigesies redeuntes,

uno ordine, febris cum exacerbationibus. Ex indicatione biliosæ febris purgans mannatum cum liquore terræ folliatæ tartari exhibeo; acida, emeticum pulmones phthysici vetabant. Aurantia insuper dulcia, & solvens decoctum cum succo aurantiorum, alvus per biduum fluxit, appetitus rediit, mixtura ex chamom. aqua, syrupo & extracta curam biliosi morbi absolvunt. At febricula continuavit post pastum vesperi nocte exacerbabatur; sudores debilitantes, sputa purulenta, cephalalgia frequens, & primæ viæ puræ tamen, vigente appetitu.

Tempus corticis peruviani rebar: decoctum hujus dilutum non saturatum propino, at ægra mox siccitatem pectoris, anxium respirium, tussim crebriorem, sputa imminuta quæritur; diluo hoc cum decocto mucilaginoso, nec hoc commode fert, recusat id strenue. Mixturam ex mucilagine radice salep. aqua & syr. rhœados, emulsum tissotianum, victum vegetabilem plasticum ex hordeo granulato, oryza, lacteis ordino, aere vernali puro fruitur & febris successive jugulata fuit. Vires redeunt, sputa parciora fiunt, sic sat commode pro suis se habuit pulmonum circumstantiis. Curam perfectam phthysicos ex vitio organico quis expectabit? præsens causa pulmones ad tussim semper ciens, peripnev-

nevmonixæ autumnales, hyemales, febres lacteæ peripnevmonixæ, semper suppuratione terminatæ, omnem spem curæ perfectæ cuique dement: ad Octobrim se commode habuit. Negotiis suis domesticis occupata; hoc pleuropnevmonia mixta correpta post epulas, in quibus carnis indulisset, copia saburræ, febris, ructus, flatus, vomituriones &c. &c. Venæsectione parca & purgante suo mannato converso in emeticum denuo restituebatur. Denuo aliquo tempore se bene habuit. Tota hyeme emulsum suum bibit, vitat injurias aëris, vere & æstate medicamina omnia seposuit, & pro genio suo vixit. Autumno 1781. gravidam se putat, non appetit, alvo sæpe obstructa laborat; abdomen increescere sentit, menstruo jam tribus mensibus caruit, & motus infantis se percipere ait, hæc quavis graviditate sibi accidisse narrat: menstrua hinc gravido jam utero duobus adhuc mensibus fluxisse semper. Obstetrix ex constitutione oris uteri negat graviditatem veram; Obstetricans magister affirmat eam initio ex percepto motu percussivo sub manu abdomini prementer adplicata, at dein omnia investigando &c. de graviditate dubitat. Hydropem uteri esse invenio, eo tum enim me consuluit: febricula simul hectica adest. Contractiones uteri aquam evacuare vo-



lentis motum infantis mentiebantur. Per vices sub his doloribus aquæ parum foetidæ flavæque ex utero stillat.

Accedit anasarca, omnia tentantur incassum per varia consilia constituta. Cortex varia forma tentatus, diureticis lenibus mixtus aliisve incassum adhibitus est; semper pectoris malis auctis. Anxietates ipsius, ab utero pleno, diaphragma premente, sæpe summæ fuere, deliquia animi, anorexia accessit, alvus parca semper, ab intestinis pressis: nil nisi jusculis, panatellis &c. vesci potuit, si levamen anxietatum desideravit. Mixturam suam ex salep. & syr. diacod. ad mortem continuavit, hac sola pectus levare ajebat. Ad ultimum halitum se gravidam existimavit, aliquoties sellam partui destinatam omnibus contradicentibus, vi adferri curavit, parturivit, & nil nisi aquam expressit. Mortua initio hyemis. Diarrhæa colliquativa vera hic nobis visa non fuit: fors humoribus dissolutis in uterum effusis: alvus laxior ante mortem, at non colliquans aderat.

Primipara
sub partu
cum utero
inflammari
incipiente,
febrique

Juvenis 19. annorum femina civis pellionis
uxor primipara, tota sub graviditate bene se
habet. Sellæ parturientium ultra 12 horas in-
fidentem sub summis vi pariendi conatibus

præ-

præmaturis suafu adstantium infidentem re-
perii. Binis vicibus generosum tockayense pu-
erperæ exhibitum fuit. Caput vertiginosum,
faciem inflatam turgentem rubram, anxium re-
spirium, abdomen continuo dolens, quasi
quid tympanitici præ se ferens, attactum re-
fugiens, sub quovis partus dolore, ob ve-
hementiam & continuitatem harum ferme con-
vellebatur. Parturientem in lectum reponi,
clyfma emolliens, catapl. tepidum ad abdo-
men, decoct. althææ cum Syrup. diacodii, nitro
tepede haurire jubeo. Phlebotomiam cele-
bro largam.

lactea æque
sub symp-
tomatibus
peripnev-
monicis.

Dolores inminuuntur, quiete dormit; & post
aliquot horas, recrudescentibus partus dolo-
ribus, situ infantis naturali existente, parit
feliciter, lochia ordinate fluunt. Tertia post
partum die tussis oritur sicca, difficultas re-
spirii, thoracis oppressio, horripilationes,
calores, pulsus plenus, & celer. Vapores
ad mammas nedum tumentes derivare jubeo,
interne tepida cum nitro exhibeo. Intume-
scunt mammæ: at nimium; clyfma salitum
revellit. Octava post partum die cerevisiam
coctam cum lactis cremore, & ovis haurit,
insuper carneis pinguibus vescitur, vomit.
Ipecacuanha vomitum juvat, & tinctura rhei,
curam confirmatoriam absolvit.

Inflamma-
tio uteri
post par-
tum instru-
mentalem,
stasis, me-
tastasis la-
ctis caseosi
in cerebro,
urinæ in-
continentia

Mercatoris conthoralis, 30 circiter anno-
rum, corporis vegeti, pleni, anno matrimo-
nii sui quinto vel sexto primum concepit.
Sub graviditate laute vixit, potu turcico la-
cteo delectabatur multum, somno pomeridia-
no indulgit. Tribus dein diebus parturivit.
Vocatus artis obstetriciæ magister; infantis
caput grande inclavatum, pelvimque male
formatam reperiit. Venæsectio facta, &
mors infantis exspectabatur. Quinta circiter
partus die excerebratio capitis facta fuit, fœ-
tusque enormiter magnus & crassus extractus.
Sphincter vesicæ debilitatus urinam stillavit,
vesica vix duo cochlearia urinæ continere va-
luit. Fors hac ex indicatione, Medicus ejus
ordinarius, corticem peruvianum, cum foliis
aurantiorum, frigide infusa, præscripsit.
Acidum, id est, succum citri cum melissæ
infuso pro potu communi propinavit. Serius
dein pulveres ex camphora, nitro, & pulve-
re hepatico rubro adhibuit. Nona post par-
tum artificialem die pro consilio me advo-
carunt.

Inveni ægram delirantem, typo conti-
nuo febricitantem remittenter, linguam albo
muco obsitam, abdomen infimum meteoristi-
cum, continuo dolens, lochia nulla, in uri-
na sedimentum caseosum, pulsus inæquales,
mox

mox duros, mox celeres, intermittentes, tenues. Mammæ habitu naturali, nullum lac continentes.

Indicationem feci uteri inflammati, & staseos lactis caseosi in cerebri vasis, prognosim formavi dubiam, medicamenta antiqua seponuntur. Ordino mixturam ex nitro, liquore terræ foliatæ tartari, roob sambuci &c. Ad abdomen cataplasma emolliens, decoctum althææ & radicis bardanæ, oleo tartari per deliquium, instillato, ad lac caseosum resolvendum, acidum absorbendum, & per urinam præprimis eliminandum: monstrante natura via. Vapores ad mammas incassum derivavimus. Clysmata emollientia æque adplicavimus; venæsectionem, & uterinæ clysmata Ordinarius strenue repudiavit. Aliquot diebus his usa; copiose lac caseosum cum urina fluxit, deinde purum lac. Abdomen mollescebat, contactum ferre etiam rudem incipiebat; quin lochia rediverint. At delirium permanfit, & ferox factum fuit undecima morbi die, nocte, oculi torvidi, spasmus oris, cachinni, pulsus summe inæquales &c. Vesicantia ad furas adplicamus, ob vim earum revellentem, & diureticam. Facta his optata revulsio; insimul alvus foetida, caseoso-putrida deposita, purgante rhab-

barino-salino juvabatur ; & delirium cessavit, ægra convaluit.

Febre serius initio remittente correpta dein in quotidianam intermittentem mutata, purgante curabatur, & cortice peruviano. Ejusdem corticis continuato usu, & tempore benefico, sphincteris debilitas evanuit, pedumque oedema, præcipue unius pedis, dolens.

Casus sequens ob insequentem secundum enarratur : quanquam ad lacteas inflammationes directæ, non pertineat.

Symptoma-
ta kenean-
gæ, hæ-
morrhagia
uteri, quan-
quam non
valida præ-
gressa, &
nervosa, ex
placentæ
remansione.

Nobilis Domina teneræ constitutionis præproperanter peperit, prægresso motu corporis validiori per saltum. Levis hæmorrhagia nata fuit. Totam per noctem utcunque valuit, lochia copiosius solito fluxere. Mane pessime valuit. Pomeridie ad consilium vocor, inveni ægram pallidissimam, continue animo delinquentem, frigide sudantem, pulsum instar fili tenuem, vix perceptibilem, & sæpe insensibilem.


Ex indicatione Keneangæ partim, ex hæmorrhagia uteri prægressa, levi quidem; at huic corpori tenero tamen morbosa; partim spasmodum uteri semet contrahentis do-

lores posthumos, multos creantis, placentam pro parte accretam eliminare volentis.

Placenta excipiebatur. Mixtura ex præparatis Cinnamomi, Menthæ & Laudano liquido S. omni dimidia hora propinabatur, & ægra brevi convaluit.

Mercatrix juvenis toto sub graviditatis tempore dolorem in abdomine profundum quærebat. Parit cito, post partum hæmorrhagia ingens. Hac per mediam jam horam durante: me vocarunt. Animi deliquia continua aderant, vomitus, extrema frigidissima &c. Extractionem placentæ, artuum ligaturas, fomenta frigida, mixturam Swietenianam ordinavi. Artis obstetriciæ Magister excipit maximam partem, at aliquam fundo uteri inseparabiliter accretam ait; malo præfagio. Hæmorrhagia cessat, removeo mixturam Swietenianam, & loco hujus emollientissima nitrosa adhibeo, & dum corpus tepore lecti jam incaluisse, repositis frigidis, cataplasmata æque emollientia, & injectiones tales uterinas mucilagineas.

Hæmorrhagia uteri ex placenta fundo uteri accreta, inflammatione gangræno-
sa uteri cum febre lactea.



Sequenti die pulsus naturali celeriores: at lochia fluunt, abdomen molle est, attactum fert, ægra utcunque se habet, appetit, dormit, motum tantum aut erectum corporis situm non fert, quin animo labatur & vomat. Tertia celeritas pulsuum ingens, & signa manifesta uteri inflammati; ab contractionibus ejus sensibilibus sub manu. Globum durum, cito incrementem manui tangendum exhibuit. Oleosa cum vitellis ovorum & nitro diacodiato, emulsa, & omnia priora aucta dosi incassum tentabantur. Insuper per vices horruit, calebat, mammæ insurgere incipiebant, lochia subsistebant. Consilium celeberrimum, in quo venæsectio parca ordinata exstitit, absque fructu; eadem enim vespere symptomata gangrænæ, singultus, delirium, fætor, frigus extremorum, media nocte moriebatur.

* In hoc casu nec methodus *C. R. Hænes*, egregia antiseptica profuisset, rebus tam subito deperditis.

**Lochiorum
stasis.**

Primipara futrix die febris lactææ lochia amisit; abdomine statim dolere, tumere incipiente. Methodo antiphlogistica lochia redeunt, & omnia cessant.

De nocte ad pauperem fœminam vocatus, a tribus jam diebus parturientem. Partus fuit humeralis ; manus propensa, vel ab obstetricibus, tres enim aderant, vel ab Chirurgo fracta fuit, fœtus mortuus. Uterus inflammatus. Venæsectio fit, versio gratis tentabatur, res ad tempus naturæ relinquitur, cataplasmatibus & clysmatibus applicatis. Pomeridie diei insequentis sponte sua parit, collapsio infante &c. Venæsectio repetita, aliave antiphlogistica ægram ex toto juvavere.

Phlogoses mammales sæpe neglectu, aut mala methodo subpurare, quis ignorat ? Phlogoses mammales.

Emplastra consueta de ranis, de spermate ceti cum camphora, raro juvant ; rem potius deteriorem reddunt.

Suctionem humanam, non autem caninam, aut vitream, quia hæ vi fiunt, & magis inflammant, emplastra emollientia, & si phlogosis disparuit, solaque durities non dolens supersit, emplastrum cicutæ, egregia reperii.

Vitandus quoque spiritus salis ammoniaci, quem aliqui, etiam Medici inungunt, vidi inflammationem auctam subpurantem, ab hoc stimulante inflammante liquido.



Theoria
lactearum
inflammationum.

Febri lactea affectis, ruit humor, cruori maxime analogus ad mammas. Si quantitate excedit : premit, distendit glandulas, vasa infarcit, regurgitat.

En mala plenitudinis.

Febris insimul præsens est, per quam secretio lactis fieri videtur. En facilem genesin inflammationis veræ lacteæ, dum plenitudini febris accedit.



CAPUT SECUNDUM.

De inflammationibus veris acrimoniosis.

§. I.

Tertia phlogistica prædispositio est præ- Theoria.
sentia stimuli cujusdam; quem Medici acrem,
salsum nuncupant.

Oritur hic


dum vel humoribus densis factis, copia earum aut quantitate per chylum novum semper aucta; vel vasis rigidis, obstructis infarctis, organis secretoriis; vel laxis collapsis, tono propellendi, secernendi privatis, secretio aut excretio materiæ acris, perspirabilis, urinæ &c. impeditur.

Vel dum causa externa, uti aer humidus, frigidus &c. excretionem ejus impedit; non imbibendo perspirabile, id repercutiendo, constringendo, vasa premendo superficialia &c.

Vel dum vitium organicum in organo secernente, aut excernente expulsionem acris prohibet; v. gr. calculi &c.

D

Vel



Vel dum acria nimis copiosa ingeruntur, falsa præprimis &c.

Vel dum effluvia volatilia acria, per pulmones, vasa resorbentia, salivam &c. humoribus nostris miscentur.

Vel dum victus natura sua acer, aut ad degenerationem acrimoniosam pronus, copiose, maxime æstate, ingeritur.

Vel dum motu humorum validiori continuato, eorum degeneratione non explicanda nascatur.

Vel dum humores infarcti, stagnantes diu, uti ex. gr. in glandulis, in humorem non amplius blandum degenerant. Uti ex musto dulci vinum stimulans, inebrians, & secundam per fermentationem acetum nascitur, tertia dein fermentatione liquamen putridum foetens, acre, volatile. Quamquam nolim, ut hoc simile, quod uti omnia alia similia, summopere claudicat, ad humores nostros directe adplicetur.

Sufficit, acrimoniam etiam canerosam in glandulis, ex humore antea blando infarcto, lacteo, degeneratione non explicabili nasci.

Vel dum primis viis generata acredo, resorptione ad secundas transfertur.

Acrimonia hæc, circulo humorum mixta, aut loco cuidam inhærens labe sua omnia,

nia, aut adjacentia, verbo ea, quibus applicatur, inficit, stimulat, irritat, incendit, & sic vel localem, vel universalem producit inflammationem.

§. II.

De inflammationibus veris catarrhalibus, defluxivis, rheumaticis, arthriticis.

Catarrhos simplices narium, anginosos, ophthalmicos, pulmonum, artuum &c. prætereo.

Exempla
morborum
simplicium
catarrho-
rum

Curantur facile mixtura sambucina cum nitro antimoniato, sibio diaphoretico non abjuto; potu tepido, diaphoretico, theato, potione riveriana, spiritu Mindereri, camphora, mixturis sambucinis, aut potui theato immixtis. Sic etiam liquore egregio arthritico Elleri Baldingero celebrato; æque pulvere sudorifero Doweri &c.

Memorabiliores commemorabo.

Temporibus epidemiæ autumnalis, vernalis, catarrhosæ, duas curavi fæminas, virum unum vitrearium, catarrho commatoso membranæ schneiderianæ, seu finuum frontalis, probabilius & partis cerebri. Etenim quasi semiapoplectici, insensiles, prostrati

Catarrhi
capitis se-
miapople-
ctici.



jacebant, ante paroxysmum de dolore premente obtuso frontis & lancinante prius artuum conquesti; hæc quidem, postquam perfrigerationi expositi fuissent. Venæsectio in pede; clyσμα falsum; purgans ex sale amaro & manna vasculatim ingestum, pedum epispastica optatam fecere revulsionem. Uni fæminæ vesicans cantharidum ob pertinacius hoc rheuma adplicare coactus fui. Vapores emolliendo discutientes dein ad sinus per nares & os derivavi insimul. Solutus morbus hic ex toto coryza profusa.

*. In his casibus non acrimonia solum; potius plenitudo acrimoniosa localis peccavit. Ideo tales morbi defluxivæque ad morbos plenitudinis cachecticos, seu acrimoniosos pertinere videntur.

Catarrhi
tracheæ.

Catarrhum tracheæ bis in uno, eodemque puero nobili observavi, perfrigerio causatum. Hic nempe tenere educatus, minimo flante ventu domui calefactæ inclusus hæsit. Tempestas bona, tranquilla, tepida adparente solum aeri expositus, & tum integumentis pelleis obvolutus. Mutata sæpe atmosphæra puer sudans perfrigeratus fuit, præprimis trachea, os enim involvere non poterant. Adparuit

paruit hic catarrhus sub tussi sicca frequenti, verbis non describenda, quasi profunde sibilosa, voce æque tali, respirio anxio. Dum delicatulus hic omnia medicamina averfaretur, in balneum calidum eum locavi, in quo, rebus ludicris variis innatantibus, piscando has, motum exercuit. Lac insimul tepidum ei propinatum per vices fuit. Sudoribus sic prolectis, in lectum, æque calefactum, repositus in perspirio continuo servabatur, ad morbi remissionem.

Rheumata temporalia æque obveniebant mihi, soluta aut sudoriferis, aut e ispastico, aut fumo specierum fumalium. &c.

Rheumata dentium simplicia vesicante parvo post aures, aut ad tempora adplicato certo solvuntur.

Catarrhos simplices dyssentericos, percusso perspirabili ad intestina, à plebe vino tepido, & nobis infusis calidis, theriaca &c. facile curatos cernebam.

Exempla inflammationum catarrhorum formatarum.

Inflam-
matio auris in,
& xterni.

Tempore epidemiæ catarrhosæ faber ferrarius, prægresso rheumate oberrante, cephalalgia, & dolore acuto auris interno pungente, pulsante corripitur. Horret, calet, sitit, noctes insomnes ob omnium exacerbationem, pulsus inflammatorius, regio auris infectæ circumcirca tumens, dolens, rubens.

Venæsectio repetita ter febrim imminuit, mala auris nil, vel parum. Nitrosa, acida, sambucina, emollientia sat copiose ingesta fuere. In aurem vapores emolliendo discutientes lactei derivantur. Externe Cataplasmata talia, paucum cum levamine adplicata.

Ad purgantia recurrebam, præcipue, quia tumentis quid in regione epigastrii adverti, abs dolore. Et hæc eccoprotica aliquot diebus continuata fuere absque multo levamine.

Chirurgus subpurationem auris externæ prælagiebat, & subpurantia tumori adplicat. Et hæc parum profunt, de nocte enim malum semper ingravescit, quin febris universalis adesset.

Præ-

Præscribo mercurialia cum cicutæ, aconiti extracto, quamquam æger rite examinatus nil venerei, præter nocturnam exacerbationem rebellem erga medelam, exhibuisset; si non scopo antisiphylitico, solvente tamen. Utitur & his absque emendatione.

Chirurgus mollitiem fluctuantem se sentire ait, tumorem amplo vulnere incidit, arteriæ majorem ramum lædit, sanguis arcuatim profilit. Sistebatur compressione, postquam ultra libram cruoris profudisset. Tumor nullum pus continuit. Ab hoc tempore morbus de die in diem inminuebatur, tumor externus disparuit, ex aure parum serosi quid stillavit. Convaluit auditu servato.

* Topica revulsio certe in inflammationibus topicis egregia est. Memini casus litteris mihi significati, ubi in apoplexia traumatica aliquot trepani absque fructu adplicati, & arteriis sectis temporalibus æger restitutus fuit.

Filiola perillustri domini *** prægressa longa obambulatione in horto tempore ventoso, austero, cephalalgia vespertina, horripilationibus correpta. Nox inquieta, jacitationes continuæ, & lamentationes inter dormiendum. Genæ rubent, carotides ferme ad visum pulsant. Mane advectus febris

Alia auris
inflammatio

eulam levem, dolores auris per vices pun-
ctorios invenio. Vapores, cataplasmata, uti
in priori casu, purgans antiphlogisticum.

In sequenti nocte mala eadem. Mane
levem venæsectionem suadeo, aut sanguisu-
gas ad aurim. Mater per omnia dilatio-
nem hujusmodi remedii efflagitat. Continu-
antur priora.

Tertia nox ut secunda. Venæsectionem
ferio urgeo, ad futuram diem denuo procras-
tinabatur.

Quarta nocte hæmorrhagia, sponte oborta,
narium inflammatio soluta fuit. Remansit
auditus gravior, ob susurrum adhuc per-
durantem, quem oleum amygdalinum cam-
phoratum, auri immisum, & sal succini vo-
latilis oleosus, pani calido inspersus & auri
applicatus perfecte tollebat.

* Et hic natura topicam fecit venæse-
ctionem.

Pleuro-pe-
ripnevmo-
nia ex ea-
tarrho ac-
glecto.

Baro centurio de P*** inchoante hyeme
catarrho pulmonali simplici affectus mixtura
pectoralis, & potu tepido levabatur.

Bachanalium tempore trahis frequenter
vectus tempestate rigidissima ad radices car-
pathi, saltui æque indulgens, vina generosa
subia-

subinde bibens , tussi recrudescente denuo adficitur , hancque negligit.

Vix bachanaliis terminatis cephalæa sua antiqua , ex lapsu oriunda , occipitali , at solito gravius affligitur. Adplicat herbas suas cephalicas consuetas , & media nocte copiosum pus ex aure fluit. Mane vocatus præter caput affectum ex pleuroperipnevmonia gravi inflammatoria decumbentem reperio.

Ad aurim emollientia , & decubitus aptum , ut pus commode effluere possit , ad pleuroperipnevmoniam suam vero venæsectiones ter repetitas largas & reliquum adparatum antiphlogisticum adhibui. Febris vehementia his sopita est , ad pectus momentaneum solum levamen iisdem expertum.

Quarta morbi die præsentē summo suffocationis metu vesicans instar orbiculi magnum lateri adfecto adplicavi. Hoc eadem adhuc die insigniter levatus fuit. Pleuritis statim disparuit , respiratio liberior evasit. Tussis aliqua cum febre levi superstes reliquam morbi materiem coxit. Soluta perfecte hæc pleuroperipnevmonia fuit , absque sputis puriformibus ; ea serosa , aquosa , falsa , pauca fuere , quæ excreavit. Quam inepte hic expectorantia adhibita fuissent , præter kermetem alterantem sudoriferum , & emollientia tepida ,



invifcantia acre ferofum, & ad colatoria fua
ablegantia. Urina fedimentum depofuit quafi
lateritium, poft veficans, per aliquot dies.

Pleuritis
defluxiva.

Mercator * * * prægreffa refrigeratione
vefpertina fudante corpore, pleuritide fubi-
tanea nocturna correptus, una venæfectione,
& tepidis affatim ftatim hauftris, fudoribus
proleclis intra aliquot horas fanatus absque
expectoratione.

Catarrhi
phlogiftici.

Catarrhi inflammatorii æque huc referen-
di, fub fymptomatibus peripneumonix aut
pleuritidis levioris occurrentes. Venam in
his bono effectû aperui.

Signa in-
flammatio-
num ca-
tarrhalium.

Signa, quibus catarrhalem, rheumaticam,
defluxivam, arthriticam &c. inflammationem
ab omni alia phlogofi diftinxi, fuere:

Epidemia catarrhalis regnans.

Dolor vagus oberrans artus, & alias par-
tes prius, antequam uni infixus fuerit.

Prægreffa perfrigeratio.

Exacerbationes fymptomatum vefperti-
næ, nocturnæque. &c.

Pleuritis
gravis rheu-
matico -
menftrualis.
Hinc com-

Tempore quoque catarrhali puellæ no-
bili 17 annorum, menftrua, ab aliquot men-
fibus parce fluentia, penitus emanfere. Do-
lores


lores lateris, sub tussi continua, tanti, ut animi deliquia, deliria momentanea produxerint. Loquela, motus corporis omnis vel ideo ferme impossibiles, Febris continua cum nocturnis exacerbationibus. Largæ 4 venæsectiones sanguinem vere pleuriticum eduxere. Linctus, decocta emollientia, mixturæ mucilaginoso-nitroso-diacodiatae, fofus lateris, abdominis &c. Clysmata & pedum balnea ob motum corporis penes hæc inevitabilem, omitti debuerant. Febris his & pleuritis mitigabatur, at vesicantia reliquias omnes hujus tollebant. Expectoratio hic magna, copiosa exorta est, & sub hac simul menstrua fluebant. Sanata in integrum expectorantibus ex gummi ammoniaco, oxymelle squillitico soluto, sibiio diaphoretico, præparatis hyssopi.

plicata ex
rheumatica
& plenitudinis
inflammatione.

* Si penes inflammationes catarrhales plenitudo æque adsit, expectoratio oritur puriformium, pituitosorum, pleuritidibus, peripneumoniis consueta. At si absit, sputa solum serosa, salsa, aquea ejiciuntur.

Compactor ex mala pectoris formatione a juventute prima phthysicus, arthritide vernali vaga, artus oberrante, tumores rubentes, dolentes, hinc & inde creante crucia-

Arthritis
inflammatoria
phthysici.



ciabatur; pulsus durus, plenus, celer, cutis sicca. Toto brevi corpore intumuit. Venæsectio aliquoties repetita sanguinem semper pleuriticum, ut in phthysicis solemne est, eduxit, at parum levavit. Purgans antiphlogisticum ne hilum profuit. Mixtura sambucina diaphoretica parum æque prod-est. Vesicantia uno in loco juvant, at in alio cruciatus majores perdurant. Balnea, quibus herbæ odoratæ incoctæ fuere, cum potu copioso saponaceo, purificante, ex bardana, althæa, liquore terræ foliatæ &c. miserum intra 14 dies curarunt.

* Aestate rheumaticos meos alios, balneis sulphureis, id est, hepar sulphuris continentibus, naturalibus, restitui. Balnea cal-
cis raro his profuisse scio.

Arthritis
brachii
cum pleu-
ritide.

Femella civis vidua macri parvusculi corporis, fenicula, in brachio olim subluxato, arthritide tumida, & ejusdem lateris pleuritide correpta fuit. Venæsectione duplici & balneis lacteis restituta, dum alia quæcunque in vanum tentata fuissent.

Corollaria.

Rheumata
simplicia
sunt dispo-

* Simplicia rheumata, seu defluxiones, absque universali febre, cum nulla, aut topi-
ca


ca saltim; quo referre debeam, anceps hæreo. Symptomata, cura, æmulantur morbos inflammatorios. Stimulus æque perspirabilis suppressi acer, inflammans est. Dein veræ formatæ inflammationes graves, rheumaticæ naturæ enarratæ sunt. Hæc profecto faciunt, quod simplices defluxiones has, ad leves locales phlogoses, ad dispositiones inflammatorias referre non dubitem.

fitiones
phlogisti-
cæ.

* * In inflammationibus plenitudinis sanæ vesicantia, opium, camphora, diaphoretica potentiora, alterantia kermetica, &c. &c. venenum essent. In his defluxivis præmissis phlebotomiis princeps sunt remedium vesicantia præprimis, quæ acre perspirabile inflammans, & per sudorem & per urinam eliminant, vel ideo post vesicantia applicata sedimentum copiosum urina cum ægrorum levamine deponit.

Differentia
curæ in-
flammatio-
nis rheu-
maticæ ab
alia pleni-
tudinis.

* * * In inflammationibus plenitudinis puris, ni cum morbo aut saburrali aut rheumatico complicatæ sint, exacerbatio vespertina vix adest.



§. III.

De Inflammationibus Phthysicorum, quæ simul chronica & periodica sunt.

Argumenta
phthysim
ad inflam-
mationum
classem
pertinere,
seu esse
morbum
inflamma-
torium.

Fors tota phthysis nil nisi morbus est inflammatorius.

Origo phthysios est inflammatio. Plurimæ, ne dicam omnes, phthyses pro causa sua agnoscunt prægressas inflammationes locales subpurantes, peripneumonias, pleuritides, catarrhos inflammatorios neglectos, &c. &c.

Natura febris phthysicæ est, pus coquere: idem frequenter in inflammationibus fieri constat.

Et quomodo quæso coctionem puris continuatam absque nova inflammatione concipiemus? Sanguis phthysicorum labe puris acris inficitur, & ab ea inflammatur, atque in pus verti videtur, una cum solidis, seu vasis suis. Latera abscessuum æque inflammata prius esse debent, antequam in pus mutantur, & ulceris amplitudo, profunditas, increseat. Dein nonne tumor externus, quam-


quamdiu pus coquit, rubet, dolet, calet, tamdiu, donec abscessus formatus sit? verbo & sub coctione puris inflammatus est. Sique pus exitum non habeat liberum, vicina denovo inficit, hæc inflammando, & subpurando. Ulcera crurum antiqua hæc luculenter docent. Idem in phthyficis fieri videtur; pus nempe semper coqui, plus minus, pro gradu phthysios diverso, pro anni tempestate & visceris affecti diversitate. E. gr. in phthysi hepatica, in peripneumoniis phthyficorum hyemalibus &c.

Dein pulmones phthyficorum, erosi, exesi quanquam, semper sectori margines abscessuum, & reliquam pulmonum superstitem partem inflammata, exhibent.

Sanguis phthyficorum quotiescunque extrahitur, plus, minus, semper tamen vere, pleuriticus est.

Methodus medendi emolliens, mucilaginosa, ut plurimum proficua phthyficis est. Venæsectio respirium eorum faciliat, oppressiones, pleuritides eorum tollit. Jam eadem remedia etiam inflammationibus medentur.

In.



Insuper præsentia continua stimuli acris, natura sua inflammatorii, nempe pus;

Denique fréquentes adeo veræ, genuinæ inflammationes phthyficorum, & exitus phthysicos quandoque in gangrænam, ultimum robur argumentis dant, phthysim esse morbum inflammatorium acrimoniosum. Continua hinc in phthyficis inflammatio adesse debet, quod priora facile docent. Maxime tamen præiens est, dum miseri universaliter febricitant.

Exempla inflammationum phthyficarum.

Inflammatioperipneumonica, pleuritica, autumnalis periodica phthyficæ. Vide Caput I. §. 3. casum imum. Ejusdem peripneumoniam lacteam. Ibidem.

Arthritidem inflammatoriam phthyfici. Vide Caput II. §. 2.

Inflammatiо anginosa phthyficorum consummatorum, in ulcera pessima vergens.

Hæmoptoe phthyficorum æque ad hæmoptoes inflammatorias pertinet. Prægredditur hanc plerumque dolor, oppressio pulmonum, tussis aucta, febris insurgens &c. & pro-

profecto, antequam vas perrosum exesum sit, inflammatum prius esse debuit.

Funium rotator Igl. ante biennium os deglutiverat. Sanguis ano ultra medium anum cum alvo fluxit, dein pus. Chirurgus quidam emeticum ei exhibuit, & os dimidium tantum ejectum fuit, quoad reliquum probabilius confunitum. Ab eo tempore vomitus, tussis cruenta & purulenta orta fuit, febris tabida accessit, verbo vera phthisis.

Phthisis
abdomina-
lis.


Capellanus H***. L***. prædispositum thoracem forma sua ad pulmonum morbos habet. Sæpe ab longiori jam tempore dum tussi vexaretur, sanguinem extussivit paucum, tussi cessante & sanguinis ejectio emanavit. Anno præsentis diebus quadragesimæ ordinarie concionabatur; at voce adeo clamorosa, ut hæmoptoe ejus cum tussi sicca, thoracis oppressione, doloribus lateris punctoriis recruduerit, cum pulsu forti, celeri.

Exem-
plum
hæmo-
phthyscos
curatæ.

Duplex venæsectio larga, cruorem eduxit pleuriticum, dolor lateris disparuit; oppressio, tussis valida, sputa sanguinea, permansere. Utebatur mixtura mucilaginoso-nitrosa, decocto emolliente mellito cum nitro; diæta vegetabili, lactea, excarni. Serius

E

sputa



sputa oriuntur viridia, purulenta, tenuia, cruore quandoque nigro permixta, foetentia, febris post pastum, de nocte sudores, præprimis in pectore. Emaciari incipit; oppressio, tussis, vehementiores. Scopo antiseptico pulverem corticis peruv., scopo inviscante & oppRESSIONI inflammatoriæ medente, pulverem Gummi arabici, commiscui, & quater de die dosi consueta exhibui.

Pro potu, scopo diuretico pus eluente &c. nitrum, scopo detergente saponaceo, mel, & decoctum emolliens cum lacte habuit, & copiose hausit.

His jugulantur sudores & febris. Continuavit corticem in decocto cum lacte, dein lichen, polygalam & herbas aliquas balsmicas fero lactis incoctas, per multas septimanas pro potu communi hausit: donec omnis oppressio, omnis tussis disparuisset, respiratione perfecte libera. Corpus denuo nutrirî, vigere incipit. Jam & carneis vescitur, bene se habet.

En exemplum hæmophthysos curatæ saltem pro tempore: at, fuitne vera hæmophthysis? Signa hujus adfuere. Sputa, febris, habitus corporis, thoracis formatio
&c.

&c. Abscessus pulmonum tamen vix aderant, sputa enim pauca fuere &c.

Imagino profecto mihi, speciem quandam phthyseos humoralis fuisse; in qua sine continui solutione in vasis pus coquitur; quin vasa ipsa in pus mutantur; exsudat hoc, transprimitur, & tussi excitata suo stimulo, ejicitur. Nonne sputa peripnevmonicorum sæpe vere puriformia imo purulenta sunt, corpus penes tabescit, & cessante diuturna expectoratione convalescunt, pulmonesque sanos retinent.

Phthysis
humoralis
sine solu-
tione con-
tinui.


Seniculi recordor quasi asthmatici, peripnevmonia hyemali, correpti validissima, cum deliriis &c.

Alia humo-
ralis phthy-
sis curata.

Sputa vere puriformia, sanguinea foetentia, viridia maxima copia is excreaverat per multas septimanas. Oedema pedum de die in diem increvit, omni nocte febricitavit, deliravit, corpus emaciabatur. Cortex peruvianus cum lichene in fero lactis & oxymelle squillitico præter spem eum restituerunt. Vivit abhinc per unum & medium annum jam sanus.

* Ad phthyfes humorales initio suo omnes organicæ pertinent. Hæ enim diutif.

Corollaria
practica.



sime per multos annos durant, ægro utcunque valente. Compressa pulmonum vasa cruorem figunt; stagnat hic, degenerat, inflammatur, in pus vertitur, exsudat, ejicitur. Dein cum tempore, sanguine infecto pulmonibus multa tussi debilitatis, sæpe periodice inflammatis, solutio continui fit, abscessus nascuntur lethales.

** Methodus ea, quæ antiseptica, roborantia, mellitis, emollientibus, saponaceis, nitrosis jungit, & nutrientibus vegetabilibus, Anglis laudata est. Iisdem Cortex per. & lac cum aqua calcis vivæ, celebratur.

*** In phthysi organica, & aliis, ubi inflammatio validior pulmones afficit, cortex solus raro juvat, quin tussim pejorat, auget siccitatem, calores, respirii difficultatem, sputa subprimit.

**** Iunguntur phthyfes sæpe morbis saburrilibus, appetitus enim phtyficorum plerumque viget, tumque omnia mala pectoris pejora fiunt. Curato morbo saburrali solventibus, purgante antiphlogistico, ea denuo meliora redduntur. Vide cap. I. §. 3. cas. I.

Pry-

** ** Phthyfes aliæ *falsæ verminosæ*, *leucophlegmaticæ*, *acrimoniosæ* &c. ad morbos pertinent saburrales. De his in tractatu, seu continuatione secunda, quæ morbos saburrales sistet, proluxius agetur.

§. 4.

Inflammationes venereæ huc referendæ.

Febris venerea continua inflammatoria celeberrimis Professoribus Stollio & Plenckio descripta.

Continua inflammatoria venerea.

Febris inflammatoria stadii primi gonorrhœici, Todio designata.


Inflammatoria gonorrhœica.

Aliæ locales venereorum phlogosæ ex gr. ophthalmiæ, anginæ, bubones, phymosis &c. &c.

Topicæ aliæ inflammationes venereorum.

Phlogosæ vulvæ duas tractandas habui. Dolor vaginæ acutissimus est intra minguendum, ambulatio impossibilis. Cataplasmata emollientia, venæsectio si febris insimul universalis adsit, decoctum altheæ diacodiæ, lac copiosè haustum, aut emulsum, linctus oleosus, dein phlogosi maxima pro parte

Phlogosæ vulvæ.



te discussa lac mercuriale, aut mercurius sublimatus cum gummi arabico in aqua solutus curam curatoriam absolvunt externam. *Vide de his celeb. Prof. PLENCK doctrinam de morbis venereis* alia acria mercurialia nociva essent, phlogolesque augerent.

§. 5.

Inflammationes & Phthyses mercuriales.

Febres inflammato-
riæ mercuriales.

Viennæ coqua, quæ ab vetula quadam pulveres albos aliquot, probabilius calomel, aut sublimatum continentes, aut plane præcipitatum album, scopo purgante, assumpsit, non autem his purgata, tertia post assumptionem die in continuam incidit, cum deliriis, collo toto ingenter tumente, rubro, dolente, fauces, os totum internum ardebant, tumebant, verbo inflammata fuere; metus suffocationis adfuit, pulsus tensus, durus, celer. Venæsectio bis repetita largior, clysmata acria, purgans enim deglutire non potuit, collyria emollientissima, linctus tales cum paucis nitro, eam servavere. Mitigata dein faucium phlogosi per epicrasim purgantibus continuavit, hisque salivationem magnam cohibuit. Flores sulphuris, (quia camphora absque effectu assumpta; et balsamica, adstrin-

gen-

gentia reliquias salivationis, & ulcera faucium, linguæ, palati, genarum internarum tollebant.

Eandem ferme febrem mihi videre contigit; at absque magna topica colli inflammatione in demorso ab cane rabido pileario, robusto, pleno viro. Penes prima salivationis conamina validissime febricitavit, arteriæ ad visum pulsabant, delirium; cursitationes, anxietates, fitis &c. Venæsectio ad unc. xvij. in pede, febrim hanc sopivit. Octava hæc post morsum die acciderant. An virus hydrophobicum quid contribuit? ignoro.

Magni viri laudant hanc methodum, mihi nunc dubiam. Tissotiano more exacte, accurate, ægrum præmemoratum tractavi. Vulnus insuper mercurio præcipitato rubro insperso apertum servatum fuit per 10 septimanas. Undecima circiter post morsum hebdomade in itinere hyemali constitutus, vino prohibito abusus, vespera ea, qua iræ & potationibus large indulgit, hydrophobiæ primis signis corripitur, & tertia die morbi hydrophobus Debreczini periit. Ni virus præsens

Demethodo
gallica anti-
hydro-
phobica.

fuiſſet in corpore, nec vinum, deletum aut
extinctum reſuſcitare potuiſſet.

De ſchmu-
ckeriana.

Alium demorſum ſervum Baronis de ***
methodo ſchmuckeriana tractavi feliciter. Sa-
nus hodie dum eſt, jam anno morſus elapſo.

Firme propoſui, ubi pars demorſa ad-
miſerit, me vivo igne virus imposterum dele-
turum, ſi ſtatim poſt morſum accerſitus fuero.

Habitus
phthyſicus
venereus.

Occurrebant mihi aliquot ægri habitu
toto phthyſico, cum ſcabiæ, ulceribus rebelli-
bus antiquis, quibus mercurialia ſub omni for-
ma, & præparato, nimis diu exhibita fuere.
Decocta mercurium eluentia ut hispanicum,
althææ cum radice mezærai, una cum diætâ
nutriente lactea vegetabili, dein roborantia
ut cortex cum emollientibus, externe bal-
ſamica plumbata &c. hos reſtituere, ſepoſito,
remoto omni mercurio.

* Corticis mezærai decoctum, cum mer-
curio ſublimate in eſſentia maſſichina juxta celeb.
Prof. PLENK, & interne inſimul electuarium
ex extr. cicutæ, aconiti, mercurio ſublimate
& roob ſambuci &c. fauces peſſime ulcerofas

ve-

venereas, & cariem ossis palati inchoantem, curarunt perfecte.

** Veram phthysim veneream se feliciter curasse, egregius beatus Prof. FELNER, fide honesti viri, narravit, mercuriali unguento nutrici inuncto, & suctione per medium annum continuata lactis hujus nutricis, in Comité juvene. ***


§. 6.

Inflammatiō cancroſa.

Antequam carcinoma aperiatur, scirrhi dolent, dolore lancinante, pulsante, periodico, sæpe perfecte ad aliquod tempus remittente. Livido rubore suffusi sunt, elevantur magis; adjacentia tumida faciunt: sic si scirrhi glandulas subaxillares occupaverint, manus, brachium intumescit. Vesiculas dein protrudunt, quæ ruptæ serum fundunt vicina inflammans, ulcerans. Latens chronica per menses, annum, & ultra hæc inflammatio est, in carcinomate quasi sepulta.

Signa
hujus.

* An methodus quorundam Practicorum laudanda sit? qui ad dolorem carcinomato-



sum sedandum purgantibus utuntur , intermixtis quidem cum usu cicutæ. Eos scopum obtinere vidi , dolor ad tempus remittit : at nonne purgante resorptio materiæ cancris in carcinomate latentis metuenda est?

Sic & plumbata adplicare cernebam , dum vesicula aperitur , & color sublividus carcinomatis ortus fuerit. Apertio cancri quidem retardatur ad tempus , at an bene, obstructa adstringentibus tractantur ? virus erumpere volens , retroprimitur &c ?

Spiritum salis ammoniaci æque quidam adplicant in priori casu. Liquidum natura sua stimulans , inflammans , nulla ratione specificum , aut antidotum materiæ cancris. Magni momenti rem , verbo conscientiosam , esse opinor , infidis medicamentis uti in morbo , qui ad hunc gradum evehctus absque mora , & retardatione nonnisi cultro tangi deberet chirurgico.

§. VII.

Inflammatio scorbutica latens.

Puellam scorbuticam pauperem hæmoptoicam curavi. Anno post curam elapso de-
nuo tussitare incipit, habitatione humida in-
clusa, morbumque negligit, & subitanea
morte obiit. Vase arterioso pulmonum per-
roso, & sub motu corporis penes hortulanas
occupationes rupto, sanguis rivatim ex ore
& naribus profiliit inter moriendum. Jam
talem erosionem absque inflammatione præ-
gressa vix concipere possum.

Ulcera scorbuticorum pessima, quorum
labia putridas inflammationes præferunt,
æque huc pertinent.

Celeberrimus Prof. PLENCK amice mihi
communicavit, se juxta Hoffmannum scor-
buticos rebelles pulvere calami aromatici bel-
le curare: sic etiam cancrum nervosum
(*Wargen: Geschwür: Krebs*) se feliciter tra-
ctare mercurio in spiritu nitri soluto satura-
te, & in libram aquæ communis guttas ali-
quot, 20 puta &c. instillando, adplicando
hanc.

Scor-



Scorbutus febrilis initians æque huc pertinet, is qui acidis vegetabilibus curatur, ut crem. tartari &c. sed initians tantum; proVectior enim scorbuticorum febris putridissima est, corticem p. acida mineralia postulans.

§. VIII.

Inflammationes urinosæ.

Urinam, acre fluidum, retentam, vesicam, uretheres, renes, inflammare, urethram perrodere, si caruncula urethræ ejus exitum prohibeat, regurgitatam cerebrum vellicare &c. vulgatum est.

§. IX.

Inflammationes variolosæ & morbillosæ.

Has, qua febres cardinales, in sequentibus pyretologiæ continuationibus tradam, ubi & epidemiam scepusiensem variolosam anni præsentis, dum plura ad hanc descriptionem necessaria collexero, consignabo.

Prima variolarum erumpentium febris, sæpe, & plurimum, naturæ est inflammatoriæ.

Se-

Secunda subpuratoria manifeste inflammatoria est, tubercula phlogistica in pus coquens.

Unius pessimæ variolosæ inflammationis hic memoriam injiciam.

In confluentibus malignis, dum exsiccari incipiunt, quandoque respiratio brevior fit, supremis humeris perficitur, pinnisque narium diductis, & ore aperto, maxilla inferiori anhelose quasi mota, semper citior fit, seu acceleratior, absque tussi tamen; inquietudo, anxietates magnæ, oriuntur, pulsus semper tenuior, debiliior evadit, vires vitæ dejiciuntur, extrema frigescunt, & brevi intra 24, aut si diu durent, intra 48 horas moriuntur.

Peripneumonia maligna suffocans variolantium, in stadio exsiccationis malignarum confluentium.

Absque effectu, SYDENHAMO docente, (in metastasi tali materiæ variolosæ, emeticum aut purgans, quandoque subitaneum ferre auxilium) utrumque adplicare vidi. Simili ratione ab Chirurgo emollientia cum expectorantibus inaniter, incassum exhibita fuere.

Vesicantia ipse absque fructu adplicui, ne vesicam quidem traxere, quanquam emplastrum velicatorium cantharidibus inspersum,



sum, & pars sale & aceto prius rubefacta fuerit.

Vapores aceti, cardiaca, camphoram, opium, ex consilio, exhibita, ad virus ad superficiem denuo expellendum, æque gratis porrecta cernebam.

Nec cortex peruvianus, nec purgantia intermixta, initio jam exsiccationis exhibita; etiam ab initio malignitatis cortice in usum vocato, nec aër liber, hoc fatale symptoma præpedire potuerant. Venæsectionem rebar fors aliquod medicamen futurum; una balneum emolliens, si parentum præjudicia hæc admisissent.

Videtur mihi hæc peripnevmonia species esse catarrhi suffocativi, lethalis ut plurimum, in quo serum phlogisticum variolosum metastatice pulmones obruens, transsudat in vasa pulmonum aërea, membranas spurias format, actionem visceris suffocat. Utinam aperire simile cadaver mihi licuisset!

§. X.

Inflammationes dyssentericæ impermixtæ.

Theoria.

Uti materia catarrhalis pleuritides producere valet; sic ad intestina rejecta enteritidem creare &c.

Co-


Cothurnarius 25 annorum per octiduum, frequenter, torminose, tenesmoide, sanguinea, alba, viridia dejecit. Emetico, mox purgante, ab Pharmacopola exhibitis, evacuatus, una post purgationes vinum rubrum aromaticum hausit.

Vocatus octava morbi die, primas vias quidem puras, at abdominis dolores continuos, validum tenesmum, dejectiones pure sanguineas ferme, regionem umbilicalem, & hypogastrii dextri tumidam, attactum refugientem, sitim, pulsus celerem, plenum &c. invenio.

Venæsectio larga duplex, balnea emollientia tepida, extra balneum cataplasmata similia, gummi arabicum interne, cum pauco nitro, & in clysmate quoque, emulum, decoctum althææ ægrum restituerunt. Dum intra nychthemera quater tantum, alvum flavum deposuisset absque dolore: tinctura rhei aquosa exhibita, curam confirmatoriam perfecit.

Alter civis dyssentericus ut prior, una venæsectione adeo melioratus, & decocto rad. salep. mucilaginoso; ut nil nisi tenesmus supermaneret. Hæmorrhoides turgentes hunc fors aut causabant, aut diuturniorem fecerant;

Dysenteria, tenesmus hæmorrhoidalis.



rant; sanguifugis apertæ, fluebant, & tenemus simul valedixit.

Dysfenteriæ
lacte ebuti-
rato cura-
tæ.

Fide Viri prænobilis narro, rusticos suos, neglecta dysfenteria laborantes (probabilius phlogistica, neglectæ enim tales esse solent, rusticorum præprimis, qui prius eam omnibus spirituosius tentant, antequam alia auxilia assumant) lacte ebutyrato, curatos fuisse.

Dysf. glutine
Scriniariorum
curatæ.

Alterius denuo fide, eos & plures alios, glutine scriniariorum, in juscule soluto, & hausto curatos.

Dysfenteria
nigra inflam-
matoria
pessima.

Pessimæ dysfenteriæ inflammatoriæ hæ sunt, quæ sanguinem quasi nigrum dejiciunt; plerumque pereunt morte gangrænosa; etiam dum morbus in melius verti videtur, vix fidem adhibeas, inopinate symptomata gangrænæ adsunt, & æger ruit in lethum inevitabilem. Accidisse scio hoc in seniculo, dum alvus jam flava, naturalem habitum induisset.

Jam Hippocrates suum morbum nigrum, lethalem declaravit.

Dysfenteriæ
inflammatoriæ
complicatæ

Dysfenteriæ inflammatoriæ sinceræ intermixtæ rarissime occurrunt; complicatæ autem eo plures, cum saburra biliosa, putrida

trida , verminosa , acri , inflammante , de quibus sequens §phus agit.

§. XI.

Inflammationes saburrales , biliosæ , verminosæ , putridæ , pestilenciales.

Sequenti ratione saburralem , putridam inflammationem concipio.

Theoria
originem ,
explicatio-
nem in-
flammatio-
num talium
exhibens.

Vel saburræ moles premit &c. & effectus plenitudinis producit.

Vel acris jam , solida primarum viarum suo stimulo irritat , resorpta sanguinem & vasa stimulat.

Vel vermes intestina rodunt.


Vel ipsa febris saburræ , remittens , simplex , ob plenitudinem , aut aliam quandam acrimoniam , præsentem , corpus jam sic ad phlogosim prædispositum ; incendit.

Vel per nervos , inexplicabili ratione , agit.

Vel metastatice deponit virus suum , & mala plenitudinis , & acrimonie topica , seu

F

vis,



vis, stimuli prementis, stimulantis &c. ex-
ferit.

Vel accedit perfrigeratione serum acre
inflammans, seu epidemia catarrhalis phlo-
gistica se jungit saburræ, & phlogosim ge-
nerat.

Vel assumpta spirituosæ, stomachicæ, aro-
maticæ, ut solitum est, aut etiam drastica
purgantia, inflammationes saburra laboran-
tibus caulat.

Vel ipsa saburra neglecta in acre, vola-
tile, putridum liquamen degenerat, inflam-
mans.

Vel æstuosum coelum, malis saburræ ac-
cedit &c. &c.

Phrenitides
bilioso-in-
flammato-
riæ.

Fabrum ferrarium harhoviensem robu-
stum virum advexerunt mihi L***m. de dia-
bulo varia differentem, de salute sua despe-
rantem, mox furentem, fugam capere vo-
lentem, & alia similia &c. clamantem, vi-
num vi expetentem &c.


Anam-

Anamnesis hæc fuit.

Ab aliquo jam tempore dispositione is laboravit æstivali biliosa; os amarum, vomituritiones, pituitæ falsæ, amaræ in faucibus collectionem matutinam, nocturnam potius, at mane se exferentem, appetitum amissum, sensit. Hunc cremato amaro, vino, pipere aliisque stimulare, excitare voluit. Labores insimul ejus duri calefacientes cœlo sub æstuante fuere, & copiosi, ruri & domi suæ. Accessit terror panicus, dum in territorio dominali vetito ligna in carbones ureret; ab custodibus sylvarum visus, & persecutus. Fuga tum sibi consuluit, at cursu celeri denovo humores exagitans. In salvo existens terroris solamen in vino quæsit. Sic phreniticus in popina factus.

Facies turgebat, sublivida quasi, attamen flavescens, vel viridescens potius, circa labia, nares, oculos.

Frons arsit; oculi non describendi atroces, hinc inde voluti. Somnus nullus; pervigiliæ. Lingua villis flavis, albis obsita tota quanta, foetor oris. Regio epigastrica tensa, sub tactu rudiori dolens, alias non. Pulsus durus, fortis, celer. Typus febris con-



tinuus cum pomeridianis, nocturnis exacerbationibus.

Venæsectio unc. xij. Mixtura salino-acida, potus solvens cum acidis, ex radicibus; ad abdomen cataplasma. Secunda die priora & venæsectio.

Tertia emeticum validum ex tartaro emetico in infuso Ipecacuanhæ. Post vomitum dormit, evigilando denuo insanit, at mitius. Vomuit fœtida, viridia, quasi bilem æruginosam, & pituitosa, pulsus mollior parum. Mixtura salina & decoctum solvens acidum eadem die resumuntur, & sequenti die continuantur, purgatur his eccoprotice, nox quieta magis.

Quinta die denuo emeticum, post quod ad se rediit, omnium primo de debilitate, & gravi morbo lamentatus. Continuavit usum salium in decocto cichorei amaro, aceto insuper instillato, & perfecte convaleuit.

Alia phrenitis bilio-
so-inflammatoria.

Juvenis 16 annorum tyro pello per tres septimanas cephalalgia, & oris amarore, appetitu dejecto, affectus, nescio, quibus usus ab alio Medico; tum me cum patre accedit. Ordinavi mixturam salinam oxymellitam, & desuper emeticum. Post vomitus melius se habuit

habuit, cephalalgiae vehementia fugata, me amplius non accedit, quanquam jussus, constitutus fuerit. Laboribus sui officii apud herum suum occupatur, indulget appetitui, unum aliudque poculum vini qua pincerna domini sui probabilius hausisse videtur. Octiduo elapso mater lacrymans me vocat, narratque filium ante biduum cephalalgia quavis hora increfcente correptum fuisse, miserumque adeo in praesens furere, ut indusia, lectum laceraret, ejularet, hosque paroxysmos periodice redire.

Prima die cremor tartari solus in aqua cum saccharo, ad unc. j. haustus & venæsectio. Secunda emeticum, & post vomitus denuo cremor tartari ut heri.

Tertia die cremor tartari continuatur, æger purgatur.

Quarta pulsu insurgente, & delirio vehementiori venæsectio, & post hanc statim emeticum; post hæc mitis murmuratio, somnus per intervalla. Continuat cremorem tartari, purgatur aliquot diebus, sub his purgationibus ad se rediit, convaluit: scopo curæ confirmatoriae tinct. rhei aquosam cum elix. viscerali & arcano duplicato assumpsit.



Aphthæ
verminoso-
putri-
do-gan-
grænosæ.

Infans 7 annorum ex aphthis verminoso-putridis per aliquot septimanas neglectis intra 24 horas sphacelo genarum & oris, turpissimo spectaculo, periit; his ultimis horis (omnibus antisepticis potentissimis, ex acidis mineralibus, cortice peruviano, camphora, vino &c. in vanum tentatis), mihi sphacelo præsentē adlatus fuit.

Non omnes casus recensebo morborum similium ex saburra & inflammatione complicatorum, mihi visos, curatos; farrago esset: quavis æstate, declinante vere, autumno, hyeme quandoque epidemice regnant. Aliquorum titulos tantum marginales e libro meo casuum extractos consignabo, ad facies diversas horum sistendas. Quosdam tamen contracte, breviter recensebo.

Continua
verminoso-
plogistica.

Delirium, febris continua, jactitationes, vomitus, abdomen tumidum tensum, in puero verminoso, qui insuper incongrua varia assumfit. Curatus narium hæmorrhagia spontanea, & purgante constante ex hydromelle infantum, pulvere contra vermes, & sale polychresto; pro potu limonada.

Pro-

Professori J***. febris inflammatorio gastrica, delirium, abdomen tumens, dolor epigastrii, hypogastria inflata dolentia; ructus putridi, foetidi, deliquia &c. venæsectione, clysmate, antiphlogisticis purgantibus curatus. Primum clyσμα, nitro acuatam copiam putridorum ovorum eduxit, quibus aliquot diebus ex peculiari appetitu vescebatur; curam perfectam rheum cum amaris absolvit.

Inflammatoria gastrica faburra turgente.

Pistoris uxor pinguis fœmina, faburra biliosa turgente, ructibus, vomituritionibus, sapore nauseoso, lingua spurca, una plethora, animi deliquiis, scintillatione oculorum, artuum stupore, verbo, prodromis apoplexiæ, adfecta: venæsectione larga pedis, & statim post hanc emeto-cathartico restituta est.

Prodromi apoplexiæ ex faburra turgente & plethora conjuncta.

Erysipelata capitis, faciei hyemalia, aut etiam æstivalia juvenum, robustorum, amatorum spirituosorum &c. plura mihi occurrebant, cum febre continua exacerbata validiori; curata venæsectionibus cum purgantibus antiphlogisticis, pulposis, acidis, salinis &c. in his diaphoretica stibiata lethum adferrent; dum faburram & phlogosim pro causa agnoscant.

Erysipelata ex faburrali phlogistica.

Febris ery-
sipelatoſa
faciei ma-
ligna, id
eſt putri-
do-inflam-
matoria,
cum thora-
cis, cerebri
affectiōe,
in corpore
cacochy-
mico.

Spectabilis S. de G*** 61 annorum a multis annis pedes ulceratos, oedematosos, lepra squammosa quasi obductos gessit, æstate ulcusculis sponte sua collapsis. Eadem tcta æstate per vices non appetiit cibum, frequenter sanguinem nigrum extuffitavit, a procul os ejus foetebat intollerabili fœculento putrido foetore, dentibus non infectis.

18 Septemb. prima vice adveſtus invenio ægri faciem ingenter tumidam ex rubro lividam, veficulosa, bullatam; delirantem per intervalla taciturne, & commatosum quandoque, halitum foetidissimum, ructus tales, linguam impurissimam, tenacem flavam pituitam inter dentes, in palato, faucibus, lingua, cibi nauseam; alvum, urinam inconſcie missam, tuffim cum exſcreatione pituitæ crassæ foetidæ, calorem corporis urentem, pulsum fortem, durum, celerem, motus omnis arbitrarii impotentiam.

Venæſectione præmiſſa sanguinem phlogisticum educens, exhibui mixturam salinam cum oxymelle, & pro potu oxysaccharum cum aqua.

17ma. Emeticum, ter vomuit foetida, pituitosa, flava, viridescencia parum, aliquoties, quater puto, dejecit.

18va.

18va. Præsentia animi, petit ad matulam, saporem amarum foetidum ipse conqueritur, lingua semper spurca, pulsus fortis, durus. Ordino levem venæsectionem, & purgans ex tamarindis, manna, cremore tartari, arcano duplicato, oxyfaccharum in potu; facies parum detumescit. Circa vesperam facies denuo livet, multum tumet; delirat, respirat difficiliter, vehementius tussitat.

19. Mane advectus, venæsectio levis, purgans continuatur. Sanguis adeo pleuritici, ut ne guttam feri contineret. Dejecit quater, iterum apte loquitur.

20. Delirium continuum, facies semper tumida, respiratio stertorosa, sputis os, fauces pleni; adhærentibus spissis, lingua tumida; reliqua ut prius, nisi pulsus intermittens. Vesicantia adplicantur furis.

Locus vesicantium parvam vesiculam exhibuit, frigus extremorum, respiratio anxiosa, pulsus inæqualis, at plenus, satis vigenz adhuc. Indicatione tamen vitali facta camphora, serpentaria, contrajerva &c., & scopo sputa incidendi elixir asthmaticum, vapores aceti: prognosis lethalis: post meridiem mors gangrænosa.

Ophthalmia curata venæsectione & purgante huc pertinent.



Febres dentientium cum acido complicatae, aut caseosa - rancida saburra eum convulsionibus suis.

Hæmorrhagiana narium plethorico - saburralis profusa C. M.*** Orta hæc periodice cum symptomatibus saburræ & plethoræ: venæsectio, purgans & post hoc acidum vitrioli, vinique abusus vitatus, eum curavere.

Anginam, tussimque vetulæ subpleuriticam ex inflammatoria stomachicam sanavi duplici venæsectione, uno emetico, & purgante eccoprotico continuato.

Aliam anginam naturæ ejusdem, at copia majore biliosæ saburræ, post venæsectionem, emetico.

Anginæ scarlatinosa eandem methodum desiderant. Semper ferme ex inflammatione saburrali originem suam trahunt: unius verminosæ scarlatinosæ anginæ recordor, absque venæsectione, emetico & purgantibus antihelmenticis dein sanatæ.

Faber murarius' pleuritide laborans ex inflammatoria - gastrica restitutus est, duplici venæsectione, & usu per triduum continuato emol-

emollientium nitroforum, donec lateris phlogosis disparuisset, id est dolor pleuriticus, dein emetico & solventibus.

Puer 8. annorum metallifossoris filius ante aliquot septimanas hyeme anginosus decubuit, ab chirurgo curatus. Post duos menses in Aprili remittenter valide febricitat, deliratur, tussitat, difficulter respirat, latus dolore punctorio cruciatur, signa saburralia, verminosa adsunt: venæsectio, ferius emeticum; & purgantia anthelmintica cum oxymelle squillico & decocto emollienti, ægrum sanarunt, vermibus pulsis.

Pleuroperipnevm.
inflamm.
verminosa.


Pistoris filiola 7. annorum per aliquot jam annos vermes nutrit, quos mater subinde pulvere semen cinnæ expellit. 15. Maji nil appetit, friget, calet remittenter.

Febris verminosa-
subinflammatoria
cum hy-
pog. & epi-
gastr. affectione.

16ta Eadem.

17ma Vocatus; narrant, totam priorem noctem insomnem, sub sudoribus continu- is exegisse, caput dolet; genæ rubent, lingua albescens, respiratio difficilis, dolor lateris sinistri tumidi, attactum tamen ferens, tussicula, alvus a biduo subpressa: prima morbi die 3 teretes cum alvo sponte elapsi. Dolenti lateri cataplasma anthelminticum rosensteinianum cum pulver. myrrhæ & aloes

in



in bile taurina incoctum adplicui. Purgans & antiphlogisticum & antiverminosum propinavi. Post 10 dejectiones surgit, nil conqueritur, vermibus aliquot pulsus; reliquam dispositionem verminosam methodo untzeriana delevi.

Colica enterico ingluviola, & verminosa.

Filiolus Domini Perill. B. ætate adhuc tenera hernia laboravit inguinali, nescio quibus remediis curata. Medio circiter Januario anni præsentis in convictu nobilium L. copiam magnam brassicæ ingerit, nocte insequente hanc ingluviem, respiratio anxiosa, suffocationis metus, dolores pleuritici, febris, abdomen intumescens. Accedit perfrigeratio, levissimo enim tegmine tectus erat in cubili vix calefacto, nocte trigidissima. Binis insuper vicibus lecto excidit, ad latus dextrum. Traditus fæminæ, quæ ei decoctum prunorum & foliorum fennæ hauriendum præbuit. Secutæ sedes duæ cum levamine & copia ascaridum.

21. Januarii meis tradebatur manibus, capite dolens, febre cum continua, lingua albo muco obsita, abdomine tumente, hypogastrio dextro toto duro, attactus vel levissimi inpatientie, incessu curvo, antrorsum in-

Inclinato corpore tantum possibili, doloribus colicis, ferme continuis, alvi obstructione; reliquis naturalibus. Concludo, vim hypogastrio per lapsum e lecto duplicem illatam, intestina vero reliqua ab saburra, ex prægressa ingluvie nata, simul verminosa, distensa esse phlogistice; verbo, morbum esse enteritico-saburrali-verminosum. Scope, occurrendi omnium primo inflammationi intestinali, seu colicæ enteriticæ, ordino in decocto emollienti mannam dissolutam, cum paucis nitro, clysmâ emolliens oleosum cum paucis sale gemmæ & thomæo saccharo, bis de die applicandum, ad abdomen cataplasma emolliens lacteum cum sapone veneto. Utebatur æger his biduo cum levamine, attactum ferre incipit, febris mitigatur, abdominis tensio residere incipit. Hac nocte insequente tegumentum, cataplasma in somno dejicit, corpus perfrigerat, priora, mane recrudescunt. Continuat ideo iisdem remediis & 23ta hæmorrhagia narium sponte oritur, & sic phlogosis intestinorum quoad maximam partem solvitur. Pomeridie clam pastam pinguem comedit. 24ta phlogosis intestinorum, tensio vix ulla, attactum fert rudem ubique. Lingua tamen impurior, foetor oris rancidus, febris remittens, vesperi & nocte

mul-

multum gravior, ructus rancidi, appetitus de-
 jectus, flatus. Ordino in electuario pulpas,
 mannam, sal amarum, syr. solutivum, &
 scopo antiputredinoso saburrali, & antiver-
 minoso, limonadam copiosam; metuebam
 enim febris saburralis transitum in putridam.
 25. Idem purgans dissolutum in fero lactis
 cum cremore tartari parato, adhibetur. 26.
 omnibus continuat. Quavis die 6. 7. purga-
 tus, foetidissima, mucosa excrevit, quin ver-
 mes alii, præter ascarides, conspicerentur;
 hac 26ta ob sedes nimis crebras medicamen-
 seponitur. 27ma ob dejectiones spontaneas
 continuatas, pulsuum tenuitatem, debilita-
 tem, ordinavi præparata menthæ cum laud.
 liquid. gutt. viii., quatuor cochlearibus diar-
 rhæa debilitans sistitur. Alia die surgit,
 appetit, convaluit absque alio medicamine.

Peripnev-
 monia in-
 flammato-
 rio - gastri-
 ca recrud-
 escens.

Artifex chalybearius habitus athletici
 vir, venæsectionem consuetam per trien-
 nium negligit, ab aliquo tempore inmodico
 labore occupatus. Obpressionem pectoris,
 impossibilitatem in pectus sinistrum decumben-
 di, anxietates, tussim siccam, sitim, con-
 fusiones mentis, oculis clausis, adpetitum in-
 super deletum, amarorem, ructus, vomitu-
 riones, linguam obsitam, febrem conti-
 nuam

nuam cum exacerbationibus, exhibuit mihi. Per quatrimum totus adparatus antiphlogisticus adhibitus, in minutis pectoris malis, emeto-cathartico multum levatur. Se ex toto sanatum existimans reponit medicamina, duroque suo labori denuo indulget. Ast post octiduum recidiva peior, periculosior, contigit. Plures modo venæsectiones, omnia alia antiphlogistica, & expectoratione semel, nescio quo errore, cohibita, vesicantia, morbus postulavit. Diarrhæa æque per emollientia, nitrosa, aliaque expectorantia remedia, orta, ægrum multum levavit. Curatus perfecte post luctam aliquot septimanarum.

Puerum pauperem *ex pleuritide milliarum*, abdomine turgente, venæsectione & dein emetico, ac continuatis purgantibus sanavi.

Dom. V**. Notarius *** febris initio catarrhali inflammatoria pulmonum, graviter sub deliriis decubuit: serius caterva symptomatum saburralium adparuit, discussa jam methodo antiphlogistica generosa pleuritidis vehementia, diarrhæam spontaneam purgantibus lenibus juvi, & convaluit.

Pleuritis
catarrhalis
inflammatoria, cum
saburra.

Comma, res-
piratio pe-
ripnevmo-
nica phlo-
gistica &
saburralis.

Viduam Judicis L. senem conmatosam cum respiratione gravi decumbentem, venæsectione una, & purgantibus continuatis juvi. Causa morbi venæsectio diu consueta neglecta, & saburra magna copia ventriculorum & adjacentia onerans, fuit.

Tussis a 30
annis scro-
phulosa; ac-
cedens he-
patitis in-
flammati-
o-bilio-
sa.

Coquus M***, vinosa, & mulsum plus in deliciis habens, quam fercula sua, tussi sicca jam a 30 annis laborat, probabilius scrophulosa &c.: plures ei mortem phthysicam præfagiebant falso præfagio; nulla purulenta, sed grandines pituitosos extuffitat, nec febricitat.

Initio veris frigidi dolorem queritur pungentem hypochondrii dextri, febrim continuam, sitim: pulsus fortis, celer est, tussis aucta sibilosa, sicca, oculi icterici, lingua flavo muco oblita, amaror oris, os foetet, alvus fluit. Venæsectio larga, & reliqua *antiphlogistica acescentia* præprimis, triduo continuato levamen hepatis, & pulmonibus adtulerunt, icterique disparitionem inchoantem; sordes oris eadem. Emeto-cathartico usus, toto dolore hepatici evanescente, febrique, quæ ex continua jam secunda die post venæsectionem in remittentem transivit, jugulata, quinta morbi die lectum

ctum deseruit, & continuato usu decocti amaricantis cum sale & tinctura rhei, potuque acescente brevi ab morbo suo convaluit posteriori.

Tussis tamen antiqua ea mansit, quæ prior fuit, nec unquam curabitur, quia æger potationes suas habituales nunquam intermitit, indulgit eis vix ab hoc morbo enarrato curatus.

Icterus juvenis viduæ manifeste saburralem ex mœrore, mortui mariti, primas vias dejicientem, ortum, solventibus saponaceis cum sale ammoniacò & acescentibus tractavi, emeticum tum adhibui cum morbi levamine. Post aliquot dies recrudit morbus at sub forma hepatica: venæsectio, emollientia nitrosa eum sanarunt.

Icterus initio saburralis, purus, dein hepaticus.


* Causa hepaticidis nascentis fors saburra prius resorbta, & emetico mota, aut alia causa mihi incognita accedens, vel venæsectio in sæmina plethorica, ante emesim intermissa fuisse adparet.

Infans aliquot dierum viridia, meconio mixta excernit pauca; convellitur, sub convulsionibus erumpunt miliaria alba, abdo-

Enteritis gangrænosa neonati ab acido & meconio retento.

G

men



men tympanitice tumet, maculæ lividæ in eo, & dorso conspicuæ sunt, sic reperi infantem in prima visitatione; prognosin lethalem formo, & post duas horas moritur.

Dysſenteria faburrales - inflammatoria frequentissime occurrunt, aut ob anni tempus phlogisticum, serum autumnum; aut ob faburram neglectam, acrem factam; aut ob ineptam medelam calidam, aromaticam, spirituofam; aut ab initio dum pura faburræ sit, neglectum emeticum, curavi plures medela summe mucilaginosæ tepida, venæsectionibus, balneis, loturis intestinorum emollientibus & discussa phlogosi pro rerum circumstantia vel purgantibus ex tamarindis in sero lactis, manna, &c. vel emeticis, & dein rheo, aliisque indicatis. Relego lectorem benevolum ad *tertium Magni STOLLII Tomum rationis medendi*, ubi ea multo accuratius depicta inveniet, ac ego depingere possem.

Casum unum solum adferre adhuc mihi liceat
dysſenteria.

Dysſenteria
putrida
enteritica
gangrænosa

Sodalis funium rotator ante triennium ex
febre intermittente neglecta cum induratione
lienæ

lien^{is} & pedum hydrope, decubuit, sanatus ab febre & hydrope, aliquo tumore subduro regionis lienalis permanente.

Decembri anni 1779. denuo peregrinatur, ac ex abusu lardi vomiturit, in cremato solamen quæsit. Diarrhæa orta, æque cremato, & aliis incongruis tentabatur, accedunt tormina, tenesmus, fæces cruentæ.

Quatuor septimanis his vexatus, dum medio Aprili vehitur, sæpius aquis maledactus; cremato vitam adhuc conservasse ægrum, auriga narrat. Iter hoc per 7 dies tempestate pluviosa duravit. Ad advenam me advocant, reperioque ægrum macrum, genis rubentem, præsentem sibi per intervalla; reliqua flavescentia; os, nares, linguam in apice rubram, in medio crusta ex flavo nigrescente oblitam, in radice, & fauces simul excoriata, deglutitionem impeditam, foetidos ructus & spiritus, sitim, in pectore strepitum absque sputis & tussi, abdomen totum meteorificum, contactum refugiens, continuo dolens, maculas circa umbilicum, & coccygis os, cærulescentes, dejectiones torminosas, tenesmoidas, ex nigro-sanguinolentas, foetentes, æruginosas, pedes ad genua hydropicos. Rem conclamatam ajo, consilium peto. In primo consilio proposuit

senior Medicus (quippe cujus prudentiæ ordinationem commisi) serum lactis aluminosum, clysmata ex lacte, quod serum æger ob tubum alimentarem excoriatum ardentem, dolentem, & colicos dolores auctos recusat.

Cerevisiam indulgit ægro petenti tenuem ob aerem fixatum in se habentem, quam autem ob copiosiores dejectiones reponere coactus, loco ejus decoctum malthi ordinat.

Vesperis singultus, dejectiones perstant, respirium parum levatum, de nocte delirium, vires vitæ dejectæ.

Secundò in consilio antiseptica ordinantur, cortex peruvianus, arnica cum rheo tosto, camphora. Rheum tostum ob alvum frequentiore reponi debet pomeridie; plus singultit, maculæ fiunt ampliores.

Tertio meteorismus parum subsidens inventus, at maculæ ampliores, continuat priora, & vinum indulgetur; insimul abdomini herbæ omnes odoratæ vino & aceto incoctæ adplicantur. His continuatur.

Quinta curæ die dolores lateris punctorii, respiratio difficilis, singultus crebrior.

Sexta foedationes lecti insciæ: reliqua ut prius, foetor cadaverosus, sequenti mane moritur.

Sectum cadaver intestina gangrænosa ,
lien solito majus, hepar compressum parvum,
pulmones inflammatos, vesicæ urinaræ mem-
branas crassiores exhibuit.


Studiosus æque ex dyssenteria putrido-
inflammatoria , initio neglecta , dein ab ve-
tulis aromatibus , theriaca, vino tractata, mi-
hi periit ; alia sub methodo, ac in casu prio-
ri, emollientissima , cum una aliave venæse-
ctione &c. &c. gangræna inopinata superve-
nit, & intra aliquot horas ægrum prostravit.

Pauperes infantes duos ex neglecta, ver-
minoso - putrido - enteritica febre perditos
sectioni subjeci : uni eorum intestina a vermi-
bus perforata reperi.

*Rheumata, aut arthriticæ febres ex sa-
burrâli phlogisticæ ad hanc morborum clas-
sem merito referuntur.*

Unius memoriam injiciam specialioris
memorabilis rheumatis , gravis, rebellis ar-
tuum & abdominis post vulnus capitis & apo-
plexiam traumaticam cum vomitu æruginoso.

Venæsectiones , clysmata , frigida ad
caput ægram ad se reduxere ; at rheuma nec
purgans , nec emeticum sero tentatum , nec



flores arnicæ , quæ vertiginem inminuebant, tollere poterant, amaror & rheuma rebellia fuere. Decocta dein solventissima, & balnea tardius malum solverant.

Practica
corollaria,

* In his enarratis inflammationibus primo semper inflammatio curatur ; dein emessi, purgante, saburram putridam, viribus antisepticis prius resectis, evacuamus.

** Limen invenire inter inflammationes & saburram, bilem, putredinem ; id est, scire, dum methodus antibiliosa, antiputrida inchoare debeat, difficilius esset, ni in tot ægris eruditi fuissetus, nempe


Dolorifica sensatio dum inminuitur, cessat.

Febris, dum typum mutat, ex continua remittens fit.

Symptomata biliosa, putrida, dum inflammatoriis prævalent, oris, ventriculi, urinæ.

*** Delirium horum complicatorum validius observavi, ac sincerarum aliarum inflammationum.

**** Pestilenciales inflammationes Auctores commemorant, dum quandoque in peste, hye.



hyemali præprimis, phlebotomiam celebra-
verint; dein nonne tam facilis gangrænescen-
tia bubonum, anthracum pestilentialium in-
flammationem putridam præsupponit?

CAPUT TERTIUM.

*De stimulorum mechanicorum inflammatio-
nibus.*

§. I.

*Febres, topicæ, & universales, dentientium,
phlogisticæ.*


Origo harum est stimulus tendens, di- Causa.
ducens, & laboriosa in dentitione premens,
lacerans, perforans, vulnerans, gingivas;
humores, serofos acres præprimis, inflam-
mantes, majori copia, ad locum irritatum,
& vicina adjacentia, proliciens.

*Acre inflammans hoc serum esse docent: ejus
effectus, sub symptomatum classe enar-
randæ.*

*Duplici aut triplici ex causa, acrimo-
niam illius seri concipio:*

G 4

Vel



Vel, quod lege ea naturæ æviterna, ubi stimulus, illuc adfluxus : humores acres, alia per colatoria evacuandi, e. gr. perspiratione, urina, &c. illac invitentur.

Vel, quod per ipsam febrem dentientium inflammatoriam, universalem quidem quandoque, humores agitati, degenerent, in serum tale phlogisticum acre, inflammans, pro parte aliqua, minimum.

Vel denique, quod alimenta prius primis viis contenta, aut in præsentī ingesta, hac eadem febris, & sero acri in ventriculum depluente, æque inficiantur, mutantur, degenerent : e. gr. dulce lac matris suctum, in acidam, caseosam, pituitosam, rancidam saburram, acrimoniamque, resorptam, & ad os internum delatam.

Symptomata.

Signa dentitionis opus annunciantia, concomitantia, ordinaria, stadii utriusque ; nempe unius, dente ex osse maxillari emergere incipiente, alterius dente mole aucta, aucto suo diametro, in gingivas vim stimuli inflammantis, exserente ; sunt sequentia.

Sexto, septimo, decimo ætatis mense, & nonnunquam tardius paullulum, circulus albus in regione gingivæ suprema exteriori conspicuus fit, dein gingivæ rubent magis, dolent,

dolent, tument, os totum internum calet, quandoque fervet, halitus difficili in dentitione quasi igneus est, & genarum ea regio, quæ denti erumpenti proxima est, aut subinde tota plaga genarum, solito magis rubet, calet, & subinde tumet; vox anginosa, obtusa, aspera nascitur; deglutitio impeditur; saliva fluit, pulmones tussitant, ventriculus contenta vomitu, intestina diarrhæa-rejiciunt: hæcque omnia ob serum acre, nervos irritans, vasa inflammans, ex tumidis, phlogisticis glandulis salivalibus, tonsillarum, veli penduli, asperæ arteriæ, œsophagi, exsudans, & destillans; oculi quandoque lacrymantur, nares stillant; insuper dentientes plorant, anguntur, ex somno subito excitati, clamant, spasmodicè unam vel aliam corporis partem movent (*zucken*) & graviore dentitione delirant, commatosi, phrenitici, hemiplectici evadunt, convelluntur; tubercula gingivarum interim crescunt, apicem den is digito, tactui percipiendum exhibent, erumpenteque dente, ni novus simul, vicinus, protrudatur, omnia disparent. Primo instadio, dum dens ex osse maxillari prorumpit, & linea alba gingivæ id indicet, infantes digitos, res omnes alias, quibus manibus potiri queunt, ori imponunt, volvant, rodunt,



mordent ; idem & in secundo stadio, facili, lenta sub dentitione, ubi dens successive increfcens, lente vafa diffendit, partes diducit, & tubercula ideo non magna, non multum phlogiftica funt, facere foliti. At in gravi, operofa, omnem gingivarum attactum fugiunt, vel cochlearia ea, quibus cibis, vafa, quibus potus ipsis adamatus, e. gr. lac; porrigitur, averfantur, remonent, & ea vido prævie jam lamentantur, flentque, faciem avertunt, os vi claudunt &c.

Cura.

Princeps remedium eft, alvum fluentem facere, aut fervare, revulfivo fcopto; id quod clyfmata, purgantia præftant.

Alia non minus neceffaria funt, balnea pedum, aut potius femicupia tepida lactea, quibus inferiora & abdomen emolliuntur, acre ferum reforpta balnei parte diluitur, avelitur.

Potulenta tepida, emollientia, phlogofi, irritatis nervis, & fero acri medentia.

Hirudines poft aures, phlebotomiam, valida oris phlogofi, aut topica capitis plenitu-


nitudine ob raptum humorum versus hoc, stimulo dentis causatum.

Nervea dein, spirit. corn. cerv. at cum emollientibus tepidis, narcoticave, nervis sero acri irritatis, & remediis prioribus enar-natis antiphlogisticis jam præmissis, alias, corpore pleno, phlogosi valida &c. certo no-cebunt.

Ad gingivas dura, glabraque adfricta, adpressis gingivis contra dentes; ni tubercula nimium doleant, tumeant; alias dolore sic aucto convulsiones merito metuendæ. Eodem fine auctores adstringentia linimenta commen-dant. Tuberculis vero multum phlogisticis emollientissima, gingivas relaxantia, inungi-mus, denique incidimus tuberculum dente jam digito tangibili.

In dentitione complicata cum pituita in-fantibus adeo frequenti, vomitum cies, aut alvum fortius duces; at vomitus erit melior, phlogosi non valida, sopita. Purgans Ill. Harrisii ex rheo & absorbentibus acido præ-sente dabis; quandoque huic aliquot grana nitri, aut guttas terr. fol. tart. addidi, & in syrupo apto exhibui, effectu egregio.

Pauci



Pauci jam sequuntur casus.

Plurimos infantes vel cum coryza, vel tussi leviori, aut diarrhæa moderata, aut salivatione, levique febricula, facile dentientes vidi. Diarrhæa spontanea maximum, naturæ sibi ipsi medentis, juvamen est, ferme omnes facile dentitionem superasse vidi quibus alvus moderate fluxit.

Tumor palpebræ superioris inflammatorius dentientis.

In puero 7. mensium dentiente, eadem in parte, ubi dens erumpere conabatur, tumor natus fuit palpebræ superioris inflammatorius, ex tarso penes cilia pus exsudavit, & tumor disparuit.

Tusses subperipneumoniacæ dentientium.

Tusses quandoque validiores dentientium sputis, seu potius expectoratione terminantur; at infantes sputa deglutiunt, & tum ni sponte bene purgentur, evacuandi deorsum.

Dentitio initio cum saburra acida, caesosa, rancida complicata, dein phrenitica, hemiplethica, convulsiva

Infans 9. mensium, puer turgens humoribus & carne febricitat remittenter (quod contactus corporis, color faciei, inquietudo, respirium acceleratum, docet; pulsum vix, aut raro, tangi ab ignoto patiuntur) anxie respirat, tussitat, clamat, alvus viri-

viridis, caseoso-pituitosa est, ab aliquot septimanis. Crusta ejus lactea, qua totus quantus obsessus fuit, ante aliquot dies sponte sua, successive exsiccata. Gingivæ tument, calent, nares parum feri stillant. Ordinavi clyσμα salitum emolliens; per os ingero, magnesiā muriæ, aliquot grana nitri, pulverem rhei, in syrupo mannato; utitur biduo, purgatur, at lingua obfessa muco albo permanet; ructitat, vomiturit; exhibui emeticum ex infuso ipecacuanhæ saccharato, vomuit viridia, caseosa, nocte insequente bene dormit. Tribus abhinc diebus se bene habuit rarius tussitavit, alvus naturalis.


Quarta post emesin die multum denuo calet, rubet tota facie, tussis sicca increfcit, gingivæ fervent. Alvus flavescens naturalis. Purgans prius ordino, infuso-decoctum emolliens, ad gingivas mucilaginem mellitonitrosam, sexies purgatus, quietus fit, ludit &c.

Biduo post 8. Julii denuo febris insurgit, priora resumuntur, & ad pedes sanguisugæ.

9. Julii melius parum se habet.

10. Jul. commatosus jacet, post aures sanguisugæ, purgans continuatur, magis acuat, omnibus his melioratis triduo utcunque se habuit, apetiit mammas, quiete dormivit,

per



per vices lusu vario lætabatur. 14. Jul. ex itinere redux, puerum delirantem, facie tumens, inflatum, oculos volvitantem quasi rubore suffusos, uno tramite diu noctuque clamantem reperio; os clausum at spiritus naribus emissus fervidus: hirudines circa venas jugulares adplicui; purgans duplicatis dosibus in usum vocatur, eccligmata emollientissima inungere frequenter jubeo; semicupium ordino, quod mater negligit, ignoro, qua ex ratione. 15. Jul. pacatus oculis apertis, at extremitatibus unius lateris sensu & motu arbitrario privatus, os, quasi tetano maxillæ laboraret clausum firmiter. Clysmata adhibeo, purgantia; sub his alia in corporis parte convellitur. Clysmata nervina ex cham. menth. spirit. corn. cerv. extract. hyosc. adplicantur. Venæsectionem urgeo, quam parentes recusant, & Chirurgus facere timet; moritur. Incisio gingivarum hic inanis fuisset, nulla vesicula tenuis adparuit, nec apex dentis sensibilis fuit.

Eidem matri tres jam infantes dentitione tali, sub aliorum Medicorum manibus æque mortui.

* Non expertum fallit dentitio, catarrhalem febrim putabit.

** Plu-



** Plura de morbis infantum ab acido, caseo, pinguedine rancida, pituita in continuatione secunda, de morbis saburralibus occurrent.

§. II.


Inflammationes vis illatæ.

Neonatus collum tumidum, vesicam magnam quasi circum circa formans secum ex utero, aut vagina fert; facies tumet æque, omni momento suffocandus, & tamen parvus fuit naturalis, nec funiculus collo circumvolutus. Clysmata jusculi falsi, cataplasma emolliens, infusus frequenter cochleatim syrupus cichorei cum rheo, aliquot guttis terr. fol. acuatus, injectiones emollientes nitrosmellitæ, vapor aceti ad nares & os directus, & cruoris e funiculo largior emissio, metum inminuunt suffocationis; intra 14 dies quoad maximam partem disparuit, reliquias subdu-ras emplastrum de cicuta cum melliloto mixtum sustulit.

Collum tumidum
neonati,
metus suffocationis.

* Probabilius obstetrix vim intulit, dum caput adprehendit &c, aut situs capitis non fuit naturalis.

Peri-



Peripnev-
monia
traumati-
ca.

Peripnevmoniam aurigæ dominalis ab ictu equi ad os pectoris ortam, sanavit generosa methodus antiphlogistica.

In dolore inflammatorio lateris murarii ab ponderum elevatione orto, oleosa vitellis ovorum subacta, cum syrupo diacodii, & lac tepidum affatim haustum egregia reperii.

Tympani-
tis, vel en-
teritis in-
flammato-
rio-subpu-
ratorio-
gangræno-
sa.

Tympanitide inflammatorio-suppuratorio-gangrænosa, ex saltu de alto nata, juvenem perire vidi, morbo aliquot septimanis neglecto; toto tempore abdomen continuo dolens fuit, ambulatio nonnisi corpore antrorsum proclivi possibilis: dum me accersissent symptomata gangrænæ aderant. Abdomen sectum ultra mensuram puris exhibuit in cavo suo, reliqua adjacentia omnia gangrænosa fuere.

Colicæ herniosæ æque huc pertinent, prolapsarum, incarcerationum herniarum.

Et prædispositiones phlogisticæ ex situ corporis. Scribis collum, lumbi dolent, tument, hypochondria obstruuntur. Sutoribus abdomen induratur. Sartores phthysici fiunt. Ramazzini hæc luculenter, docte docuit.


Item

Item febres vulnerariæ.

Puella 16 annorum, ex fractura ossis tibiæ & fibulæ complicata cum vulnere amplo exorbitanter febricitavit, nec venæsectio, nec nitrosa, aliave antiphlogistica moderabant febrim hanc vulnerariam, corticem adhibui subpuratione nedum inchoante, & febris moderata, subpuratio bona evaserunt.

De corticis
per. virtute
febres vul-
nerarias
moderan-
te.

In vulneribus framea lata ictis, una cum fracturis duplicatis ulnæ & radii, corporis cachochymici seniculi, (ob excessus spirituosorum, aliosque affectus immoderatos, iræ &c. febre quasi phrenitica omni anno peridice affecti) ad febrem vulnerariam magnam & sequelas ejus, præcavendam, Chirurgus præstans militaris corticem peruv. statim omni 4ta hora dr. i. puto, ingessit, & felicissimo eventu febris moderata, subpuratio bona secuta fuit, dum constitutio vulnerum, fracturarum, humorum pravorum, & ætas pessima præfagissent.



CAPUT QUARTUM.

De inflammationibus latentibus.

Omnes paryæ topicæ internæ inflammationes huc pertinent: scrophulæ suppurantes pulmonum, catarrhi, inflammationes phthysicorum &c. &c.

Scrophulæ
chroni-
cæ periodi-
cæ inflam-
mationes
latentes
suppuratæ.

Tricesimator, vini amans fenescere incipiens tota æstate tussitat cum levioribus pectoris obpressionibus, sputa ex pituitoso-puriformia excreat cum frustillis ex albo flavis, lentis magnitudine; hyeme pleuritis accedit. Venæsectiones & adparatus reliquus antiphlogisticus pleuritidem sanant: at expectoratio semper talis, ut æstate, nunquam sputa copiosa rite cocta. Per vices omni febre caruit, pulmones libere respirarunt, at nonnunquam aliquot diebus denuo continuo typo pulsus febrilis, obpressio levis, tussis major, sputa tum parum copiosiora, cum febris inminutione, uti æstate. Levis phlebotomia & emollientia levamen semper adtulere. Expectorantia stibiata ægre tulit. Tempore apyrexiaæ perfectæ febrilis, pilulas antiscrophulosas ex cicuta, gummi ammoniaco, sapone, calomelle exigua dosi exhibui, cum potu emolliente; his restitutus fuit.

Ig-

* Iglovix ad fæminam ductus fum, fuf-
focationi proximam. Examinando adftantes
in caufam referunt; ægram tubercula magna
colli aliquot annis geffiffe, hæc difparuiſſe,
& eam ab hoc tempore ſemper gravius aſth-
maticam. Clyſmata ordino plebotomiam,
& pilulas eãſdem, ut in priori caſu, niſi calo-
mel ea doſi, uti venereis, cataplãſma cir-
ca collum. Decoctum emolliens. Non am-
plius vocatus, ægram ſepultam exiſtimavi;
quæ mihi tertia aut quarta abhinc ſeptima-
na obviat, reſpiratione utcunq̃ libera, re-
convaleſcit dein ex integro.

Aſthma
grave ſero-
phuloſum.


Genitor meus optimus catarrho, rauci-
tate correptus, tempore venæſectioni a mul-
tis annis ſacro, autumnali, venæſectione,
potu diaphoretico emollienti ſtibiato intra
aliquot dies convaleſcit.

Catarrhus
inflamma-
torius la-
teas.

Exponit ſe denuo frigori & quinta vel
ſexta abhinc die catarrhi primi curati, ob-
preſſio pectoris, tuſſis valida, reſpiratio ve-
ſperi anxia, difficilis, omnis decubitus in-
poſſibilis, ſedendo niſi ſpiritum trahere po-
tuit, pulſus intermittens; at nullatenus fe-
brilis, reliqua omnia bona, naturalia adpe-
titus vigit, ſputa tenuia, ſeroſa; vires videntur.

H 2

Emol-



Emollientia tepida, mixtura nitroso-slibiata, linctus ex syrupis emollientibus cum oxymelle expectorationem majorem inchoantem promovent, antequam tussi sputa ejecta fuere, quasi strepitum coctionis in pulmonibus edebant: nihilominus respiratio manet gravis: ad kermetem confugi, sub usu hujus tanta orta expectoratio pituitosorum puriformium, ut ferme imperito metum phthysicos incussisset. Remoto kermete adhuc perduravit. Purgante dein revellente, & decocto lichenis, corticisque per. moderata, curata est. Sputa in universum integro mense ejecta.

* Fefellit me absentia febris, catarrhum simplicem rebar, vena fors aliquoties aperta si fuisset, tanta expectoratio diuturna subsecuta vix fuisset.

Carditis
initio la-
tens.

Amicus collega Physicus Scepusii celebris practicus D. Engel casum mihi praelegit dextre & docte consignatum, carditis latentis sub symptomatibus febris saburralis remittentis. Aliquoties hæc recrudit, vomitu purulento sanguineo terminata. In universum ægro ultra viginti vascula, seu orbicula, cruoris extracta fuere successive, donec convaluisset.

CA-

CAPUT V.

Inflammationes chronicæ & periodicæ.

Passim jam occurebant , uti Phthyficorum peripnevmonix , pleuritides autumnales.

Hæmophthis chronica Capellani; v. priora.


Ophthalmix chronicæ , periodicæ Cachecticorum.

Varices vetularum inflammatae , quæ dolentes , rubentes , tumentes , suppurantes , sanguiifugis & balneo coriaceo roborante , atque fasciis levantur , curantur. Distinguendæ ab gravidarum varicibus.

Varices
vetularum
& gravidarum.

Iuvenem feminam gravidam vidi , varicibus uno in pede unius digiti crassitiem æmulantibus , & in labio vulvæ instar magnitudinis prunorum propendentibus. Venæsectio , balnea tepida , nitrosa , decubitus in aliud latus has inminuit , partus curavit.

Periodicæ inflammationes ab chronicis non multum differunt , easdem causas agnoscent ,



scunt, aut debilitatem & plenitudinem topicam, aut acrimoniam localem, seu stimulum acrem, sæpe ob laxam partem illuc depositum inflammantem. Explicari rite posse has chronicas inflammationes autumno, ex idea varicum vetularum inflammatarum, aut ulcerum pedum, quorum margines continui inflammati sunt, serpentinaque,

Alia quoque divisio superest in inflammationes epidemicas, sporadicas. Catarrhales epidemice ferme semper regnant, ad montes plurimum, maxime tempore ventoso, vix non omni autumno, hyeme, vere. Exemplum recens catarrhus ruficus, seu septemtrionalis suppeditavit.

Inflammationes venenorum præterii. Ad vulnerarios, seu traumaticos pertinent stimulos.



CAPUT SEXTUM.

De differentia curarum inflammationum.

Cura inflammationum est diversa.

1) *Pro diversitate corporum affecto-
rum, vel medice loquendo, pro diversitate
temperamenti.*

Quivis quidem homo alios humores, temperamentum sibi proprium habere videtur; at in multis tamen cum sociis suis convenit. Differentiam ponunt, varia hominum matrimonialis permixtio, diversa educatio, diversi affectus, aliud vitæ regimen. Clima, sexus, ætas; & vel ideo ars nostra conjecturalis est, dum sæpe idem remedium in eodem morbo egregium repertum in alio simili fallit.

Rigido rustico, aut pleno pluries venam aperies, ac laxo hypochondriaco, leucocophlegmatico, aut fæminæ hystericæ, infante debili.

Phthyfico peripnevmonico non dabis sibiata multa, aut nitrosa copiosa, nec kermetem multum, nec vesicantia applicabis, bene vero emollientissima inviscantia, mucilaginosæ &c.

Diversa pro anni, tempestate.

Æstivales, rheumaticæ phlogoses non tantas postulant phlebotomias, ut plenitudinis, facilius iterum æstivales curabis, ac hyemales &c.

Diversa pro natura epidemiæ.

In inflammationibus impermixtis solam adhibebis stricte sic dictam methodum antiphlogisticam. In complicatis saburralibus, putridis, æque sæpe epidemicis, mixtam methodum, post antiphlogisticam, antibiliosam, antiputridam.

In catarrhalibus longe aliam; præmissis antiphlogisticis ac in biliosa, aut plenitudinis inflammatione.

Diversa pro stimulo inflammante diverso.

In inflammatione metuenda ab opio, aliis venenis præmissis antidoto, sæpe prius emeticum dabis; at in enteritide formata alia, vitabis.

In

In levi inflammatione rheumatica, sudorifera, alterantia, imo opium, & in gravissima quaque præmissis phlebotomiis vesicantia; quæ in plenitudinis inflammatione fugies.

In inflammationibus venereis topicis mercurium cum emollientibus mixtum adplicabis, e. gr. lac mercuriale, mercurium sublimatum cum gummi arabico; an hæc interne in febre universali siphyliticorum adplicabis?

Salina copiosa æque in inflammationibus venereis vitabis, ne acrimoniam acrimoniæ addas; diarrhæam, mercurium elabi facientem, si prius ingestus fuit, & debilitantem, humores alioquin attenuatos educentem, crees.

Diversa pro viscere adfecto.

In phrenitide purgantia antiphlogistica profunt; an hæc in peripnevmonia, morbo per sputa judicari solito? In enteritide non dabis acida, aut nitrum copiosum, inflammatione metuenda traumatica capitis: frigida adhibebis, an hæc lateri pleuritico adplicabis?



In ophthalmiis chronicis unguentum ophthalmicum rubrum mercuriale proderit ; an juvabit chemosim ? &c.

Diversa pro exitu.

In inflammatione subpurante , in gangrænosa , antiseptica , roborantia ; quæ in alia initiante , aut resolvi incipiente , aut expectoratione terminari volente profecto fugies.

In hepatitide præmissis præmittendis ad subpurationem præcavendam mercurium adhibent.


Methodus generalis inflammationem curandi est, ea , quæ acrimoniam inflammantem eluit , inviscat , ad colatoria ablegat , vasa irritata sopit ; ideo emollientia nitrosa , quæ excretiones urinæ juvant , acida quæ humores expansos densant , vasa extensa constringunt , atque excretiones auget &c. , aut ea , quæ stimulum ex sanguine demit , quantitatem inminuit , venæsectione , purgantibus , & sic etiam vasa collabi facit.

Specifica esset, si antidotum omni inflammationi medelam adferens possideremus, uti mercurium in lue, corticem peruvianum in intermittentibus, radicem filicis maris in tænia. Sed an in rerum natura existere possit? quæstio est; inflammationibus natura sua diversissimis.


Exitus peculiaris quandoque inflammationum est; in pleudomembranam, si serum phlogisticum spissum transudet, & membranam piceam glutinosam, adjacentia secum coagulantem, formet; hæc membrana pleuræ, pulmonibus accrescit, aut si in substantiam pulmonum, aut trachæam exsudet, catarrhus suffocans producitur lethalis, plurimum,

Descriptio quædam inflammationis.

Est conditio corporis febrilis continua, quandoque cum exacerbationibus, vel ab stimulo plenitudinis premente, distendente, condensante, excretiones inminuente; vel acri irritante, stimulante, vulnerante; vel humores, vasa, expandente &c. ortus, humores validius, ac in statu sano fit, movens; hi
vasa,



vasa , vasa autem reciproce magis humores :
vergens vel in resolutionem , stimulo per cola-
toria ablegato ; vel in pus , vel gangrænam ,
vel scirrhum , cancrum , vel pseudomem-
branam ; omnia corpora afficiens , quia om-
nia stimulorum capacia sunt , infantilia , juve-
nilia , senilia , omniaque temperamenta.



<i>Pag.</i>	<i>Lin.</i>	<i>Emendanda.</i>	<i>Corrige.</i>
22	26	revellenda	revellendo.
23	3	pāralysi	paralyfin.
--	25	tollere	emendare.
30	2	Matrem	Matri.
31	19 (adde)	ob fabricam suam	teneriorem, &
		mollis cerebri parvam	resistentiam.
33	4	dejectionem virium	dejectio vi-
		plenariam	rium plenaria.
--	9	aquosa	dein aquosa.
34	I - 7	NB. ad marginem pertinuisse casus	
		insequentis.	
35	28	pharmacopæ	pharmacopolæ.
39	5	pleuperipnevmonia	pleuroperipnevmonia
50	10	explicendo	explicanda.
51	22	catarho	ex catarrho.
53	13	eispastico	epispassico.
81	I in marg.	theoria	theoriam.
96	I	Judicis L.	Judicis F.
105	22	denis	dentis.
108	23	tangiab	tangi ab.

